

Evidence-Based Medicine

Inhalt

Zweck und Verfahrensweise	163	Amoxicillin lindert bei Kleinkindern mit Otitis media nach 4 Tagen die Symptome stärker als Placebo. Eine Therapie über 11 Tage zeigt keinen Effekt	179
Zusätzliche, als Abstracts im ACP Journal Club erschienene Artikel	164	Cisaprid war bei Kindern mit Obstipation als Kurzzeitbehandlung wirksam	180
EBM-Notizbuch		Routineuntersuchung vor Kataraktoperation bewirkt keine Senkung der Rate unerwünschter medizinischer Ereignisse	181
CARE: Klinische Bewertung der Zuverlässigkeit von Untersuchungen	165	Diagnose	
Therapie		Die Tachypnoe ist bei Kindern mit akuten Atemwegsinfektionen ein nützlicher Pneumonie-Prädiktor	182
Vitamin E senkte bei Erwachsenen mit hohem Risiko kardiovaskulärer Ereignisse nicht die Myokardinfarkt-, Mortalitäts- oder Schlaganfallrate	167	Eine Atemfrequenz von ≥ 60 Atemzügen pro Minute hatte zur Hypoxie-Erkennung bei Säuglingen eine hohe Sensitivität	183
Übersicht: Isolierte systolische Hypertonie erhöht bei älteren Menschen die Mortalität und Morbidität und sollte behandelt werden	168	Gallengangsszintigraphie hatte zur Vorhersage pathologischer Befunde im Ductus choledochus eine hohe Sensitivität und Spezifität	184
Inhalatives Budesonid und orales Prednison führten nach Entlassung aus der Notaufnahme zu ähnlichen Asthmaerzidivratem	169	Ätiologie	
Ein ambulantes, interdisziplinäres pulmonales Rehabilitationsprogramm war bei schweren chronischen Lungenerkrankungen wirksam	170	Patienten mit Karotisstenose wiesen ein hohes Schlaganfallrisiko auf, und manche Schlaganfallarten konnten durch eine Endarteriektomie nicht verhindert werden	185
Übersicht: Behandlungsinduzierte Blutdrucksenkungen bei Schwangeren können mit verringertem fetalen Wachstum einhergehen	171	Qualitätsverbesserung	
Bei chronischer Herzinsuffizienz verringerte Metoprolol CR/XL die Mortalität, Krankenhausaufnahmen und Symptome	172	Ein kritisches Vorgehen senkte bei ambulant erworbener Pneumonie die Kosten ohne Beeinträchtigung der Therapiesicherheit und -wirksamkeit	186
Übersicht: Antidepressiva bewirken bei ungeklärten körperlichen Symptomen und Syndromen eine klinische Besserung	173	Ärztliche Rückkopplung plus telefonische Betreuung verbesserte bei Primärversorgungspatienten mit Depression die Behandlungsergebnisse	187
Übersicht: Frühzeitige Behandlung kann bei akutem Herpes zoster die Herpes-assoziierte Neuralgie verhindern bzw. ihre Dauer verkürzen	174	Praxisbasierte Schulung von Primärversorgungsärzten verbesserte weder Erkennung einer Depression noch Behandlungsergebnis bei Depressionen	188
Manuelle Therapie und Bewegungsübungen verbesserten bei aktivierter Gonarthrose die Gelenkbeweglichkeit	175	Ökonomie	
Übersicht: Glucosamin und Chondroitin verbessern bei aktivierter Arthrose die Zielgrößen, die Effektgröße ist jedoch unklar	176	Kurzer ärztlicher Rat an Problemtrinker verringerte den Alkoholkonsum und aus gesellschaftlicher Sicht die Kosten ...	189
Übersicht: Die Evidenz zeigt nicht eindeutig, dass präventive Hausbesuche bei älteren Menschen die Mortalität senken oder gesundheitsbezogene Zielgrößen verbessern	177	Leitfaden zur klinischen Vorhersage	
Übersicht: Bei Kleinkindern mit Schlafproblemen sind nicht-medikamentöse Behandlungen langfristig eindeutig wirksamer	178	Eine klinische Vorhersageregeln mit modifizierbaren Risikofaktoren sagte bei älteren Frauen einen Leistungsabbau vorher	190
		Glossar	191
		Sonderdruckbestellung	192