



Topische Anwendung von Capsaicin in der Dermatologie zur Therapie von Juckreiz und Schmerz.
 Oben: Prurigo nodularis.
 Links: Massive Exkorationen vor der Therapie.
 Rechts: Zustand nach einer 5-wöchigen 0,075%igen Capsaicin-Therapie
 Mitte: Immunreaktivität für Substanz P (SP) in den subepidermalen Nervenfasern (Pfeil) und deren Umgebung (Pfeilspitze) bei unbehandelter Prurigo nodularis.
 Falschfarbendarstellung, Confokale Laserscan Mikroskopie, Vergrößerung 800 x
 Unten: Vollständige Depletion von SP in den Nervenfasern (Pfeil) während der Capsaicintherapie.
 Vergrößerung 400 x
 (siehe auch Beitrag S. Reimann et al., S. 164 in diesem Heft)

Anfragen aus der Praxis

A. Geusau
 Prophylaxe des Pyoderma gangraenosum 200

Dermatologie in Kunst und Geschichte

A. Frièdli · J. Pierriard-Wolfensberger · M. Harms
 Die Plica Polonica im 21. Jahrhundert 201

Fort- und Weiterbildung

H. Löffler · I. Effendy · R. Happle
 Die irritative Kontaktdermatitis 203

DDG aktuell

Mitteilungen der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft 219

Verschiedenes

Buchbesprechungen 158, 172, 181, 191, 199, 222
 Fachnachrichten 221
 Kongreßkalender A 31