



**Bullöses Pemphigoid.**  
 Oben: Subepidermale Blasenbildung, geringes Entzündungsinfiltrat im oberen Korium, zahlreiche eosinophile Granulozyten im Blasenlumen (Vergr. 400:1)  
 Unten: Schematische Darstellung des humanen BP180-Proteins (siehe auch Beitrag von E. Schmidt et al., S. 637 in diesem Heft)

## Berichte und Briefe

S. Schliemann-Willers

Bericht über die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Epidemiologie, Biostatistik und Informatik (EBI) der DDG und das 1. Europäische Teledermatologie-Symposium am 19. und 20. November 1999 in Jena

695

U. Mrowietz · E. Christophers

Bericht über die 8. Psoriasis-Fachtagung, Bad Bentheim, 3.–4. März 2000

697

R. Stadler

Die besten Fälle der Schnittsammlung der American Society of Dermatopathology

700

## In memoriam

H. Kerl

Hans Kresbach (1923–2000). Eine persönliche Erinnerung

701

## Fort- und Weiterbildung

T.W. Fischer · P. Elsner

Good Clinical Practice. Bedeutung für die dermatologische Forschung

704

## DDG aktuell

Mitteilungen der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft

715

## Verschiedenes

Buchbesprechungen

681, 694, 699

Fachnachrichten

728

Kongreßkalender

A 37