

Evidence-Based Medicine

Inhalt

Zweck und Verfahrensweise	2	Ovarialkarzinom-Screening war durchführbar, senkte aber nicht die Inzidenz oder -Mortalität eines Erstkarzinoms	20
Zusätzliche, als Abstracts im ACP Journal Club erschienene Artikel	3	McCall-Scheidenplastik war nach vaginaler Hysterektomie zur Prävention von Enterozelen wirksam	21
EBM-Notizbuch		Übersicht: Vitamin B6 ist bei prämenstruellem Syndrom nützlich	22
Die Suche nach Antworten auf gut strukturierte Fragen	4	Bei Mammakarzinom verbesserten postoperative Strahlentherapie und Tamoxifen die lokale Tumorkontrolle und Überlebensrate .	23
Essentiell für die Bewertung von Tests in der Medizin: Was ist unter »Likelihood ratio« zu verstehen?	7	Übersicht: Amantadin und Rimantadin sind bei gesunden Erwachsenen wirksam, Rimantadin ist aber verträglicher	24
Therapie		Übersicht: Bei Kopfläusen sind 3 verschiedene Pedikulizid-Zubereitungen wirksam	25
CPAP war bei leichtem Schlafapnoe/-hypopnoe-Syndrom von Nutzen	9	Übersicht: Es mangelt an Evidenz über die Wirksamkeit von Zinkpastillen bei Erkältungssymptomen	26
Paroxetin senkte bei Patienten mit Synkopen und Resistenz/Intoleranz gegenüber anderen medikamentösen Therapien die Rezidivrate	10	Kontinuierliche Terbinafin-Einnahme war zur Heilung der Fußnagel-Onychomykose wirksamer als intermittierende Itraconazol-Einnahme	27
Langsame, repetitive transkranielle Magnetstimulation war bei schweren Depressionen wirksam	11	Ultraschalltherapie führte bei Tendinosis calcarea der Schulter zu klinischer Besserung	28
Kurze ärztliche Beratung verminderte den Alkoholkonsum bei älteren Erwachsenen	12	Acarbose war bei Typ-2-Diabetikern zur dauerhaften Blutzuckereinstellung wirksam, wies jedoch unerwünschte Wirkungen auf	29
Übersicht: Initiale Endoskopie ist zur Behandlung der Dyspepsie nicht wirksam	13	Prognose	
Hochdosiertes Nitroglycerin war bei chronischer Analfissur nicht wirksamer als die Standarddosis	14	Erwachsene Epileptiker hatten erhöhte Mortalitätsraten, aber ein geringes Risiko für unmittelbar Epilepsie-bedingte Todesfälle .	30
Botulinustoxin-A-Injektionen waren zur vollständigen Heilung einer Analfissur wirksamer als Nitroglycerin	15	Ätiologie	
Loperamid plus Simethicon senkten die Dauer und die Symptomatik akuter Diarrhö	16	Übersicht: Hochdosierte inhalative Kortikosteroide erhöhen bei Asthmatikern das Risiko für einige unerwünschte systemische Wirkungen	31
Übersicht: Bei leichter chronischer und schwangerschaftsbedingter Hypertonie verbessern Antihypertensiva die mütterlichen Zielgrößen	17	Palpable Zysten in der Brust waren mit einem erhöhten Mammakarzinom-Risiko verbunden	32
Entbindung durch elektiven Kaiserschnitt senkte bei HIV-1-Infektion die Rate der vertikalen Übertragung	18	Sonderdruckbestellung	U-3
Übersicht: Antibiotikaphylaxe verringert die infektiösen Komplikationen bei Kaiserschnitt	19		