

# Evidence-Based Medicine

## Inhalt

<b>Zweck und Verfahrensweise</b> .....	34	Orales Midazolam ist zur Akutbehandlung von Krampfanfällen bei refraktärer Epilepsie eine sinnvolle Alternative zu rektalem Diazepam .....	50
<b>Zusätzliche, als Abstract im ACP Journal Club erschienene Artikel</b> .....	35	Pergolid verringerte bei Restless-Legs-Syndrom die Anzahl unwillkürlicher periodischer Beinbewegungen und verbesserte den Schlaf .....	51
<b>EBM-Notizbuch</b>		Übersicht: Niedrigdosierte Antidepressiva sind bei Depressionen wirksam und gehen mit weniger unerwünschten Wirkungen einher .....	52
Fortschritte bei evidenzbasierten Informationsquellen für die klinische Praxis .....	36	Übersicht: Studien mit ausreichender Nachbeobachtung zeigen bei Alkoholabhängigkeit keinen eindeutigen Nutzen durch eine Pharmakotherapie .....	53
Anhang: Ausgewählte evidenzbasierte Quellen zur Gesundheitsversorgung .....	37	Transzervikale Endometriumresektion erwies sich bei starken Menstruationsblutungen nach bis zu 2 Jahren als wirksam und akzeptabel .....	54
<b>Therapie</b>		Laparoskopische Hernienoperation war zur Verkürzung der Heilungsdauer und postoperativen Analgesie besser als die Shouldice-Operation .....	55
Übersicht: Aspirin senkt bei Patienten mit früherer TIA oder früherem Schlaganfall das Schlaganfallrisiko, zeigt jedoch keine Dosis-Wirkungs-Beziehung .....	39	Übersicht: Nagelextraktion in Verbindung mit Phenol verhindert bei eingewachsenem Zehennagel ein Rezidiv .....	56
Übersicht: Niedrigdosierte Thiazide sind bei Hypertonie die wirksamsten First-Line-Medikamente .....	40	Das Baby-Check-Heft hatte bei Müttern mit Säuglingen im Alter von $\leq 6$ Monaten keinen Einfluss auf die Häufigkeit der Arztkonsultationen .....	57
Spiroolacton senkte bei hochgradiger chronischer Herzinsuffizienz die Mortalität .....	41	<b>Diagnostik</b>	
Übersicht: Langzeitbehandlung mit $\beta$ -Blockern senkt die Mortalität nach Myokardinfarkt .....	42	Übersicht: Durch körperliche Untersuchung kann bei Niedrigrisiko-Erwachsenen eine Meningitis ausgeschlossen werden ...	58
Mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren senkten nach kürzlich erlittenem Myokardinfarkt Mortalität und Morbidität ..	43	Übersicht: Sensitiver TSH-Assay hat bei unselektionierten stationären Patienten eine geringe diagnostische Genauigkeit ..	59
Atorvastatin senkte bei Patienten mit stabiler KHK die Rate ischämischer Ereignisse mindestens genauso wirksam wie die PTCA .....	44	Vollblut-Antikörpertests wiesen bei der Erkennung einer Helicobacter-pylori-Infektion keine hohe Sensitivität auf .....	60
Übersicht: Avitale Impfstoffe verhindern Pertussis genauso wirksam wie Ganzkeimimpfstoffe und weisen weniger unerwünschte Wirkungen auf .....	45	Der $^{13}\text{C}$ -Harnstoff-Bluttest gewährleistet eine genaue Erkennung von Helicobacter-pylori-Infektionen .....	61
Übersicht: $\beta$ -Mimetika plus Ipratropiumbromid verringern bei Erwachsenen mit akutem Asthma die Atemwegsobstruktion ..	46	<b>Ätiologie</b>	
Inhalatives Budesonid plus orales Prednison senkten bei Patienten mit akutem Asthma nach Entlassung aus der Notaufnahme die Rezidivrate .....	47	Diastolischer Blutdruck und Gewichtszunahme waren Prädiktoren für späteres Hypertonie-Risiko .....	62
Glukokortikoide senkten bei exazerbierter chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung kurzzeitig die Therapieversagerrate .....	48	<b>Glossar</b> .....	63
14tägiges Behandlungsschema mit hochdosierten inhalativen Kortikosteroiden war bei persistierendem nächtlichen Husten wirksamer als mit Placebo .....	49	<b>Sonderdruckbestellungen</b> .....	64