

Evidence-Based Medicine

Inhalt

Zweck und Verfahrensweise	66	Injektion für 1 Jahr die Symptome	82
Zusätzliche, als Abstract im ACP Journal Club erschienene Artikel	67	Übersicht: Bei Cox- und Gonarthrose kann Bewegungstherapie Schmerzen und Bewegungseinschränkung vermindern	83
EBM-Notizbuch		Raloxifen senkte bei postmenopausalen Frauen die Häufigkeit der Wirbelfrakturen	84
Bewertung der verdeckten Behandlungszuteilung und Verblindung in randomisierten kontrollierten Studien: Wozu?	68	Bei HIV-1-infizierten Patienten mit Tuberkulose senkte Trimethoprim-Sulfamethoxazol die Morbidität und Mortalität ..	85
Die Einbeziehung der verdeckten Behandlungszuteilung und Verblindung in randomisierte kontrollierte Studien	70	Intra- und subkutane lumbosakrale Injektionen mit sterilem Wasser waren zur Schmerzlinderung im ersten Geburtsstadium wirksamer als Placebo-Injektionen	86
Therapie		Als Adjuvans zur Lumpektomie und Radiotherapie senkte Tamoxifen bei Frauen mit duktalem Carcinoma in situ die Rate der Mammakarzinom-Ereignisse	87
Übersicht: Glukokortikoide verringern bei Krupp innerhalb von 6 Stunden die Symptome	71	Anwendung einer undurchlässigen Wundrandschutzfolie senkte die Rate postoperativer Wundinfektionen	88
Übersicht: Antibiotika bewirken bei akuter Bronchitis einen leichten Nutzen	72	Omeprazol war zur Kontrolle von Sodbrennen nach 4 und 8 Wochen besser als Cisaprid oder Placebo	89
Übersicht: Penicillin V oder Amoxicillin sind bei akuter Sinusitis maxillaris wirksamer als Placebo und genauso wirksam wie Nicht-Penicillin-Antibiotika	73	Übersicht: Medizinische Entscheidungshilfen erweitern das Wissen, verringern Entscheidungskonflikte und fördern die aktive Beteiligung an Entscheidungsfindungsprozessen	90
Intranasaler Grippe-Lebendimpfstoff aus abgeschwächten Viren senkte bei gesunden Erwachsenen die Rate schwerer fieberhafter Erkrankungen	74	Diagnose	
Teilnahme an einer Asthmaschulung senkte die Asthmamorbidity nicht stärker als die übliche medizinische Behandlung	75	Übersicht: Screeningtests sind zur Erkennung einer Schlafapnoe bei Erwachsenen nicht so genau wie die Ganznacht-Polysomnographie	91
Gräserpollen-Immuntherapie über 3 bis 4 Jahre war nach Beendigung der Behandlung weitere 3 Jahre wirksam	76	Ätiologie	
Ramipril senkte bei erwachsenen Hochrisikopatienten die Mortalität und die kardiovaskuläre Morbidität	77	Operationsvolumen war bei 8 häufigen Operationen nicht mit der 30-Tages-Mortalität assoziiert	92
Übersicht: Verschiedene Interventionen zur Primärprävention bewirken eine leichte Verringerung kardiovaskulärer Risikofaktoren, haben jedoch keinen eindeutigen Einfluss auf die Mortalität	78	Übersicht: Hohe Homocysteinspiegel sind mit einem erhöhten Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen assoziiert	93
Gemfibrozil senkte bei Männern mit koronarer Herzkrankheit (KHK) und niedrigen HDL-Cholesterinspiegeln das Risiko von Koronarereignissen	79	Qualitätsverbesserung	
Empirische Eradikationstherapie war bei Helicobacter-pylori-Infektion und Dyspepsie wirksamer als endoskopisch kontrollierte Behandlung	80	Übersicht: Interaktive medizinische Fortbildung ist zur Verbesserung der ärztlichen Leistung wirksam	94
Bei Depression setzten mehr Patienten die Behandlung mit Fluoxetin fort als mit Desipramin oder Imipramin	81	Glossar	95
Bei Karpaltunnelsyndrom linderte eine Methylprednisolon-		Sonderdruckbestellungen	96