

Evidence-Based Medicine

Inhalt

Zweck und Verfahrensweise	98	Konventionelle und neuere Antihypertensiva zeigten bei älteren Patienten mit Hypertonie die gleiche Wirksamkeit	115
Zusätzliche, als Abstract im ACP Journal Club erschienene Artikel	99	Paroxetin führte bei sozialer Phobie zur Symptomverringerng	116
EBM-Notizbuch		Antidepressiva plus kognitive Therapie senkten bei Depression mit Restsymptomen die Rezidivrate	117
Wichtige Quellen für systematische Reviews	100	Übersicht: Lithium-Dosiserhöhung führt bei therapieresistenter Depression zu höheren Ansprechraten	118
Therapie		Frauen mit Mammakarzinom waren mit der hausärztlichen Nachsorge zufriedener als mit der ambulanten Nachsorge im Krankenhaus	119
Hyaluronsäure verbesserte bei aktivierter Gonarthrose die Gehfähigkeit und die kurzzeitige Kniegelenkbeweglichkeit	103	Übersicht: b-Sitosterine verringern bei Patienten mit benigner Prostatahyperplasie kurzzeitig die urologischen Symptome	120
Rofecoxib führte bei Arthrosepatienten im Vergleich zu Ibuprofen seltener zu endoskopisch gesicherten Gastroduodenalulzera	104	Tägliche Nahrungsergänzung mit b-Carotin schützte nicht vor Hautkrebs, aber die tägliche Anwendung eines Sonnenschutzmittels verringerte die Inzidenz von Plattenepithelkarzinomen	121
Celecoxib war bei rheumatoider Arthritis genauso wirksam wie Naproxen, führte jedoch seltener zu endoskopisch gesicherten Ulzera	105	Diagnose	
Übersicht: Frühmobilisation kann bei Erkrankungen und nach Operation besser sein als Bettruhe	106	Ein negativer D-Dimer-Test und ein klinisch geringes Risiko schlossen eine TVT bei symptomatischen Patienten sicher aus	122
Ein Bewegungsprogramm (8 Sitzungen) war bei subakuten oder chronischen Kreuzschmerzen wirksam	107	Ein negativer D-Dimer-Test allein oder in Kombination mit einem klinisch geringen Risiko schloss symptomatische TVTs sicher aus	123
Übersicht: Die Evidenz stützt bei lumbalem Bandscheibenprolaps die operative Therapie, ist bei LWS-Spondylose jedoch nicht eindeutig	108	Ein Nüchtern-Blutzuckerspiegel von $\geq 7,8$ mmol/l war zur Erkennung einer schlechten Diabeseinstellung sensitiv, aber nicht spezifisch	124
Spacer aus abgedichteten Plastiktrinkflaschen waren bei Kindern mit akutem Asthma genauso wirksam wie konventionelle Spacer	109	Ätiologie	
Zanamivir beschleunigt bei Grippe die Symptomlinderung	110	Das Risiko der HIV-Übertragung beim Stillen war in den ersten Lebensmonaten am höchsten	125
Ein- oder zweimal tägliche Einnahme von Oseltamivir bewirkte eine sichere Grippeprävention	111	Leitfaden zur klinischen Vorhersage	
Übersicht: Antithrombotika verhindern Schlaganfälle bei nichtvalvulärem Vorhofflimmern	112	Die Hochrisiko-Kriterien eines klinischen Modells waren zur Vorhersage einer Extrauterin gravidität spezifisch, aber nicht sensitiv	126
Übersicht: Psychopädagogische Programme senken die MI-Rezidivrate und verbessern einige Zielgrößen der körperlichen Gesundheit	113	Glossar	127
Eine multidisziplinäre häusliche Intervention senkte bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz die Letalität und die Rate der Wiederaufnahmen	114	Sonderdruckbestellungen	128