

Evidence-Based Medicine

Inhalt

Zweck und Verfahrensweise	130	Übersicht: Es fehlt an Daten über die Wirksamkeit von Präventions- und Behandlungsstrategien bei diabetischem Fußulkus	147
Zusätzliche, als Abstracts im ACP Journal Club erschienene Artikel	131	Übersicht: Antibiotika-Prophylaxe senkt bei Patienten mit neurogener Blase die Rate asymptomatischer Harnwegsinfektionen	148
EBM-Notizbuch		Alendronat verringerte bei postmenopausalen Frauen mit Osteoporose und bestehenden Ermüdungsfrakturen die Anzahl der Tage mit Bettruhe und Aktivitätseinschränkung	149
Evidenzbasierte Medizin in Entwicklungsländern – Notwendigkeit und Möglichkeiten	132	Lokale Steroidinjektion, Naproxen und einfache analgetische Behandlung führten bei Epikondylitis lateralis zu ähnlichen 1-Jahres-Raten der Symptomlinderung	150
Rezensionsecke	134	Übersicht: Injektionsbehandlung ist zur Schmerzlinderung bei benignen chronischen Kreuzschmerzen nicht wirksamer als Placebo	151
Therapie		Schnuller haben während einer Venenpunktion bei reifen Neugeborenen eine stärkere analgetische Wirkung als Zuckergelösungen	152
Sofortige Antiandrogen-Therapie nach Prostatakarzinom-Operation erhöhte die Überlebensrate	135	Übersicht: Ein Spatel mit ausgezogener Spitze ist zur Erkennung einer Dyskaryose in Zervixabstrichen wirksamer als der Ayre-Spatel	153
Übersicht: Die Aushändigung von Aufzeichnungen oder schriftlichen Zusammenfassungen der Arztkonsultationen könnte Krebspatienten helfen	136	Diagnose	
Übersicht: Ipratropiumbromid führt in Kombination mit β -Mimetika bei akutem Asthma zur Verbesserung der Lungenfunktion und zur Senkung der Hospitalisierungsrate ...	137	Übersicht: Neuere Diagnostikverfahren verbessern die Sensitivität des Screenings auf Zervixläsionen, jedoch bei wesentlich höheren Kosten	154
Übersicht: Haemophilus-influenzae-Schluckimpfung verringert Anzahl und Schweregrad rezidivierender Bronchitiden	138	Übersicht: Diagnostische Tests auf bakterielle Rhinosinusitis sind nur mäßig genau; Antibiotika senken die klinische Versagerate	155
Orales Montelukast verringerte bei erwachsenen Asthmatikern die belastungsinduzierte Bronchokonstriktion wirksamer als inhalatives Salmeterol	139	Der Uriscreeen-Test war bei Kindern zur Erkennung einer Harnwegsinfektion nicht besser geeignet als übliche Urinanalyse und Urinstick-Tests	156
Hochdosiertes Lisinopril war bei chronischer Herzinsuffizienz zur Senkung der Rate der aus Mortalität und kardiovaskulären Ereignissen kombinierten Endpunkte wirksamer als niedrig-dosiertes Lisinopril	140	Der patientennahe FlexSure-Test hatte zur Erkennung einer Helicobacter-pylori-Infektion eine geringe Sensitivität und hohe Spezifität	157
Übersicht: Hoch- und mitteldosierte orale Antikoagulanzen senken bei KHK die Ereignisrate, erhöhen jedoch die Rate schwerer Blutungen und sind nicht wirksamer als Aspirin	141	Ätiologie	
Häufiges Füttern mit geringen Kuhmilchmengen beschleunigte die Genesung von Säuglingen mit Diarrhoe	142	Ältere, durch Betreuung des gesundheitlich beeinträchtigten Partners überlastete Menschen hatten eine erhöhte Mortalität ..	158
Lactobacillus GG senkte bei Kindern mit Antibiotika-Therapie die Diarrhoe-Rate	143	Glossar	159
Übersicht: Neuere und ältere Antidepressiva zeigen ähnliche Wirksamkeit und Gesamtabbruchraten, aber unterschiedliche Nebenwirkungen	144	Sonderdruckbestellung	160
Übersicht: Bei Patienten mit funktionellen gastrointestinalen Störungen verringern Antidepressiva Symptome und Schmerzen	145		
Hypericum-Extrakt war bei mäßig schwerer Depression wirksamer als Placebo und ebenso wirksam wie Imipramin	146		