

Nr. 2/2000, 7. Jahrgang

P. Faul
Editorial

5

Abstracts von Vorträgen der 26. Gemeinsamen Tagung der Bayerischen Urologenvereinigung und der Österreichischen Gesellschaft für Urologie, 11. bis 13. Mai 2000, Memmingen

Freitag, 12. Mai 2000

Prostatakarzinom – Diagnostik	7-18
Prostatakarzinom – Therapie	18-25
Freie Themen	26-27

Samstag, 13. Mai 2000

BPH	27-32
Freie Themen	32-44

Hinweise für Autoren, Impressum	46
---------------------------------	----

Fachinformation zu S. 2

PROSCAR®-Filmtabletten Z.Nr.:1-19689 ZULASSUNGSINHABER: MERCK SHARP & DOHME Ges.m.b.H., Wien. HERSTELLER: MERCK SHARP & DOHME B.V. Haarlem Niederlande.

ZUSAMMENSETZUNG: Eine Filmtablette enthält 5 mg Finasterid. **ANWENDUNGSGEBIETE:** Benigne Prostata-Hyperplasie (BPH). **GEGENANZEIGEN:** Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile, Frauen, Kinder. Schwangerschaft und Stillperiode: PROSCAR® ist in der Schwangerschaft sowie bei vermuteter Schwangerschaft kontraindiziert, da 5 α -Reduktase-Hemmer die Umwandlung von Testosteron zu DHT hemmen und deshalb Anomalitäten der foetalen äußeren männlichen Geschlechtsorgane auftreten können, falls das Präparat während der Schwangerschaft eingenommen wird. Es ist nicht bekannt, ob Finasterid in die Muttermilch ausgeschieden wird.

ABGABE: Rezept- und apothekenpflichtig.

Weitere Angaben zu Dosierung, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der „Austria-Codex-Fachinformation“ zu entnehmen.

Fachinformation zu S. 6

Casodex 50 mg Filmtabletten

Zusammensetzung (arzneilich wirksame Bestandteile nach Art und Menge): Jede Filmtablette enthält 50 mg Bicalutamid. **Anwendungsgebiete:** Behandlung des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms, bei dem eine Suppression der Testosteronwirkung indiziert ist, in Kombination mit einem LHRH-Agonisten oder nach einer chirurgischen Kastration. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Bicalutamid oder einen anderen Bestandteil des Präparates; bestehende klinisch relevante EKG-Veränderungen (z. B. AV-Block, QT-Syndrom) oder kardiovaskuläre Erkrankungen; schwere Leberfunktionsstörungen; Frauen und Kinder. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Gewöhnungseffekten und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der „Austria Codex-Fachinformation“ zu entnehmen. Rezept- und apothekenpflichtig. Casodex ist das eingetragene Warenzeichen für Bicalutamid. Weitere Informationen erhalten Sie bei AstraZeneca, Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien.