

HYPERFORAT®

Depressionen, psychische und nervöse Störungen, nervöse Unruhe und Erschöpfung, Wetterfühligkeit.

Vegetativ stabilisierend, gut verträglich.



Zusammensetzung: Hyperforat-Tropfen: 100 g enthalten: Extr. fl. Herb. Hyperici perf. 100 g, stand. auf 0,2 mg Hypericin* pro ml. Enth. 50 Vol.-% Alkohol. Hyperforat-Dragees: 1 Dragee à 0,5 g enthält: Extr. sicc. Herb. Hyperici perf. 40 mg, stand. auf 0,05 mg Hypericin*. Hyperforat-Ampullen: 1 Ampulle enthält: 1 ml Extr. fl. aquos. Herb. Hyperici perf. stand. auf ca. 0,05 mg Hypericin* (*und verwandte Verbindungen, berechnet auf Hypericin).

Anwendungsgebiete: Depressionen, auch im Klimakterium, psychische Unruhe und nervöse Störungen, nervöse Unruhe und Erschöpfung, Wetterfühligkeit, vegetative Dystonie. Tropfen in der Kinderpraxis: Enuresis, Stottern, psychische Hemmungen, Reizüberflutungssyndrom.

Gegenanzeigen: Keine.

Nebenwirkungen: Photosensibilisierung ist möglich, insbesondere bei hellhäutigen Personen.

Dosierung: Hyperforat-Tropfen: 2-3 x täglich 20-30 Tropfen vor dem Essen in etwas Flüssigkeit einnehmen. Hyperforat-Dragees: 2-3 x täglich 1-2 Dragees vor dem Essen einnehmen. Zur Beachtung: Bei Kindern entsprechend geringer dosieren. Häufig ist eine einschleichende Dosierung besonders wirksam. Hyperforat-Ampullen: Täglich 1-2 ml i.m. oder langsam i.v. injizieren.

Handelsformen und Preise: Hyperforat-Tropfen: 30 ml (N1) DM 9,72; 50 ml (N2) DM 15,40; 100 ml (N3) DM 25,91. Hyperforat-Dragees: 30 St. (N1) DM 7,85; 100 St. (N3) DM 19,87. Hyperforat-Ampullen: 5x1 ml (N1) DM 10,75; 10x1 ml (N2) DM 19,87; 25x1 ml (N3) DM 44,40; 50x1 ml DM 79,97; 100x1 ml DM 139,95.



Dr. Gustav Klein,
Arzneipflanzenforschung,
77732 Zell-Harmersbach/
Schwarzwald

INHALT

Editorial

- 159 Inselzauber
R. Lachner

Übersichten

- 164 Morbus Gaucher – eine Einführung
A. Rolfs
- 165 Zweites Leben mit Enzym-
substitution – Klinik und Therapie
des Morbus Gaucher
Cl. Niederau
- 168 Pharmakologie neuerer Makrolide
R. Stahlmann

Originalien

- 169 Atemwegsinfektionen
bei Erwachsenen
W. Elies
- 171 Atemwegsinfektionen
im Kindesalter
D. Hofmann
- 172 Antibiotika-Therapie in der Praxis
U. Borchard
- 174 Behandlungsstrategien bei pAVK
G. Rudofsky
- 175 Periphere arterielle Verschluss-
krankheit
M. Camci
- 177 Diagnose und Therapie der
„Instabilen Blase“
M. Zellner

Geschichte der Medizin

- 179 Leibbinden und Beinkleider
M. Vasold

Diabetes spezial

- 187 Alle Risikofaktoren erkennen
und adäquat behandeln!
H. Bierl

Kongreßberichte

- 190 Allergische Rhinitis:
Sichere Therapie und Prophylaxe
mit Mometason-Nasenspray
- 191 Die Instabile Blase
- 192 Prostaglandin E₁ –
seine Bedeutung für die heutige
Therapie der peripheren arteriellen
Verschlusskrankheit

Präparat-Informationen

- 193 Vitravene®

Reisen International

- 194 Ägypten –
Reise ins siebte Millennium, 2. Teil
R. Scheunemann
- 200 Achensee
Tirols Sport & Vital Park

Rotenburger Gespräche

202

Reisen in Deutschland

- 203 Der „Fußball-Kaiser“ ist vom
ganzheitlichen Konzept der
MEIRO-Gruppe angetan
I. Schmidt

notabene memory

- 206 Dankel
Barbara Jordan

Impressum

206