



Das Zystitissyndrom
(Artikel auf Seite 11)

Editorial

Gibt es bald einen sicheren Marker zur Früherkennung von Harnblasentumoren? 3

Urologie international

Fortgeschrittenes Prostatakarzinom

Parenterale Östrogenapplikation oder totaler Androgenentzug? 6

Therapie der Stressinkontinenz

Pubovaginale Schlingenplastik als OP-Methode der ersten Wahl? 6

Prostatahyperplasie

Permixon erhöht Harnfluss und reduziert Nykturie 7

Erektile Dysfunktion nach radikaler Prostatektomie

Kann Viagra helfen? 8

Oberflächliche Blasenkarzinome

Kann die Rezidivbildung vorhergesagt werden? 10

Laser-Prostatektomie

Druck-Fluss-Messung findet geeignete Patienten? 10

Originalia

Das Zystitissyndrom

Therapie und Reinfektionsprophylaxe von Zystitiden 11

Kasuistik

Laparoskopie

Minimal-invasive Entfernung eines Fremdkörpers aus der Harnblase 16

Übersicht

Update für die Praxis

Prostatapunktion: zu einer neuen Standardisierung 18

Prisma

Instabile Blase

Ärztliche Fehleinschätzung des Problems .. 21

Aging Male

Keine Krankheit, aber dennoch Sache des Urologen 24

Stressinkontinenz

Hohe Heilungsraten mit neuen minimal invasiven Verfahren 25

Evidenz und Akzeptanz steigen

Pflanzenextrakte bei BPH 29

Blickpunkt Praxis

Uro-IGEL

Die urologische Vertragspraxis im Wandel . 30

Fortbildungskurse

Der ältere Mann im Mittelpunkt 31

Rationierung im Gesundheitswesen

Schulte-Sasse: Im Grunde nichts Neues 35

Der Patient rückt ins Blickfeld

Die neue Macht im Gesundheitswesen? 36

Kongress-Information 26, 32

Arztrecht 37

Impressum 37

extracta
urologica
fragt

Bei polyzystischen Nieren vom Erwachsenentyp haben etwa 20 % der Patienten intrakranielle Aneurysmen. Sie lassen sich sehr gut durch eine MR-Angiographie nachweisen. Wann sollte diese Untersuchung durchgeführt werden?

1. bei der Erstdiagnose,
2. bei Anstieg des arteriellen Blutdrucks,
3. mehrmals anlässlich der routinemäßigen Nachkontrollen?

Antwort auf Seite 7