

Die ipos Torsionsschiene



Indikation:
Haupteinsatzgebiet dieser Rotationsfederstab-Orthese ist die pathologische Innenrotation des Unterschenkels und des Fußes. In leichten Fällen kann eine operative Korrektur vermieden werden.

Funktion:
Der Torsionsstab ist distal im Schuh und proximal an einem Beckengürtel befestigt. Dadurch wird eine stufenlos einstellbare Torsionskraft erreicht und somit die Gegenkraft zur Behandlung existierender Rotationsfehlstellungen.

für eine
erfolgreiche
Behandlung...

Technische Ausführung:

- Beckengürt- und Schuhanschlußteile aus Titan
- proximaler und distaler Aufnahmekörper für Torsionsstab aus Aluminium
- Torsionsstab aus homogenem Elastomer (Vulkollan)
- Wadenband aus Leder gefertigt
- Der Torsionsstab kann aus den Aufnahmekörpern jeweils um bis zu 20 mm herausgezogen werden, um die Orthese entsprechend zu verlängern.

...die von Kindern akzeptiert wird

Konsequent am Menschen orientiert

ipos® ORTHOPADIE INDUSTRIELL

Postfach 1845 · 21308 Lüneburg · Telefon (04131) 810 31 · Fax (04131) 1 84 72

Inhaltsverzeichnis

Hüftdysplasie

R. Brückl
Der Hüftwert als Entscheidungshilfe zur Operationsindikation bei der jugendlichen Dysplasiehüfte 661

M. Schramm, D. Hohmann, E. Rohm, H. Kraus, R. P. Pitto
20 Jahre Follow-up nach sphärischer Pfannenosteotomie bei residueller Hüftdysplasie 667

R. Brückl
Die „Restdysplasie“ nach kongenitaler Hüftluxation – ein Behandlungsverlauf über 16 Jahre 671

Hüftarthroplastik

A. A. Ghassem Khanloo, P. Thümler, R. Müller
Eine neue Positionsanalyse von Pfannenendoprothesen anhand einfacher Röntgenaufnahme des Hüftgelenkes a.-p. 675

D. Göbel
Intrafemorale Druckmessung zur Designoptimierung des proximalen, femoralen Zementsiegels: Abhängigkeit von Siegel- und Femurformen, sowie Siegelkonsistenz 679

G. Möckel, C. Perka, J. Rösler
Bewegungsanalyse bei Patienten nach Implantation einer Hüfttotalendoprothese – Auswirkungen der Implantatlage auf das postoperative Gangbild .. 684

C. Döttl, J. Hochreiter
Zweizeitige Hüfttotalendoprothesenversorgung – Operationstechnik und Ergebnisse bei großen Beinlängendifferenzen 690