



Sporotrichose.
 Hintergrund: Sporotrix schenckii auf Sabouraud-Glukose-Agar
 Vordergrund oben: Sporen in der HE-Färbung
 Vordergrund mitte: Lymphokutane Sporotrichose
 Vordergrund unten: Fixe Kutane Sporotrichose
 (siehe auch Beitrag von A. Köhler et al., S. 509 in diesem Heft)

Dermatologie in Kunst und Geschichte

N. Kuner · W. Hartschuh

Darstellung des Pyoderma gangraenosum in einem dermatologischen Atlas des frühen 19. Jahrhunderts

519

Berichte und Briefe

K.-U. Krämer · B.-R. Balda

Stellungnahme zur Arbeit von P. Altmeyer, D. Seifarth, M. Bacharach-Buhles: „Hochdosierte intravenöse Immunglobulin (IVIg)-Therapie bei therapieresistenter ANCA-negativer, nekrotisierender Vaskulitis“. Hautarzt (1999) 50:853–858

524

D. Lämmer

Stellungnahme zur Arbeit von M. Jünger, A. Steins, B. Schlagenhauß und G. Rassner: „Mikrozirkulation des kutanen Melanoms“. Der Hautarzt (1999) 50:848–852

527

Fort- und Weiterbildung

C. Fritsch · N.J. Neumann · T. Ruzicka · P. Lehmann

Photodiagnostische Testverfahren. Teil 3: Fluoreszenzdiagnostik mit δ -Aminolävulinäure-induzierten Porphyrinen (FDAP) in der Dermatologie

528

DDG aktuell

Mitteilungen der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft

546

Verschiedenes

Buchbesprechung

495

Fachnachrichten

559

Kongresskalender

A 31