

Schwerpunkt Atemwegsinfekte



Bis zu acht Atemwegsinfekte jährlich sind bei Kindern ganz normal. Lassen Sie statt der „chemischen Keule“ ruhig auch einmal Ihren „grünen Daumen“ spielen, um die Kleinen wieder fit zu machen

30

**Kräuter, Kneipp & Wadenwickel**

Zum Stellenwert natürlicher Behandlungsverfahren bei Atemwegsinfekten.....30

**Patienten-Service**

Tee-Rezepte für das kranke Kind.....32

**Pneumonie-Behandlung**

Tipps zur kalkulierten Antibiotika-Behandlung.....34

**Interview**

Antibiotika-Therapie in der Kinderarzt-Praxis.....36

**Praxis Heute**

Nur die treffende Diagnose schützt vorm Regress.....38

**Praxis Plus**

Bei Kleinkindern halten sich Ärzte mit der Antibiotika-Verordnung zurück.....39

**ÄP-Service**

Termine, Adressen und Infos aus dem Internet.....40



Bitte beachten Sie auch die Beilage eXtra mit dem Titel „Contramatum vertreibt den grippalen Infekt“

Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich Pädiatrie finden Sie auf unserer Homepage <http://www.aerztlichepraxis.de>

Ihre Empfehlung für Patienten!

**Vor dem Pflaster Octenisept®**



- schmerzfrei
- farblos
- aus der Apotheke
- praktisch für unterwegs

**Octenisept® Wund Desinfektion**

Antiseptikum zur unterstützenden Wundbehandlung  
schmerzfrei, farblos

50 ml S&M

**ÖKO-TEST 7/2000:**

Von 23 getesteten Mitteln zur Wundbehandlung erhielten 11 die Bewertung „nicht empfehlenswert“, 5 „weniger empfehlenswert“, 6 „eingeschränkt empfehlenswert“ und nur 1 das Prädikat „empfehlenswert“: Octenisept®



100 g Lösung enthalten: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxylethanol 2,0 g, (3-Cococ-fettsäureamidopropyl)-dimethylammonacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser, Natriumhydroxid, Benzalkoniumchlorid. Zur wiederholten zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Octenisept sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Für die Anwendung bei Kindern unter 8 Jahren liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor. **Warnhinweise:** Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Bei Spülungen in der Mundhöhle verursacht Octenisept vorübergehend einen bitteren Geschmack. Octenisept sollte nicht in größeren Mengen verschluckt werden oder in größeren Mengen z. B. durch versehentliche Injektion, in den Blutkreislauf gelangen. **Schmerzmittel:** Bei Schmerzen können Schmerzmittel gegeben werden.

**Zum Kennenlernen einfach das 50-ml-Muster abfordern!**

— Nur eine Anforderung pro Jahr möglich —  
Schülke & Mayr GmbH • 22840 Norderstedt  
Telefon 040-521 00 666 • Telefax 040-521 00 253  
[www.schuelke-mayr.com](http://www.schuelke-mayr.com)  
e-mail: [mail@schuelke-mayr.com](mailto:mail@schuelke-mayr.com)

Praxisstempel

C O U P O N

APP-C-2/01

Unterschrift