

Aktueller Kommentar

- R. Happle
Segmentale Typ-2-Manifestation autosomal dominanter Hautkrankheiten. Entwicklung eines neuen formalgenetischen Konzeptes 283

Übersichten

- G. Petter · U.-F. Haustein
Seltene und neu beschriebene histologische Varianten des kutanen Plattenepithelkarzinoms. Klassifikation nach Histopathologie, Zytomorphologie und Malignität 288
- V. Waldmann · M. Deichmann · A. Jäckel
Disseminierte Melanomzellen in Blut und Knochenmark. Bedeutung und Nachweis durch potenzielle Tumormarker 298

Leitlinien und Empfehlungen

- K. Hoffmann · E. Hölzle · J. Ulrich · D. Dill-Müller · A. Blum · P. Gottlöber
Leitlinien zur Qualitätssicherung der Sonographie in der Dermatologie. Fassung der Untergruppe Ultraschall in der Dermatologie der Subkommission Physikalische Verfahren in der Dermatologie vom Januar 2000 304

Originalien

- W. Harth · R. Linse
Botulinophilie. Die neue Lifestyle-Venenophilie 312
- M. Stücker · F.-G. Bechara · M. Bacharach-Buhles · P. Pieper · P. Altmeyer
Was bleibt von der Haut nach 2000 Jahren Moor? 316
- R.-M. Szeimies · T. Lorenzen · S. Karrer · C. Abels · A. Plettenberg
Photochemotherapie kutaner Aids-assoziiierter Kaposi-Sarkome mit Indocyaningrün und Laserlicht 322

Farbbildkasuistiken

- O.Ph. Kreyden · J. Hafner · G. Burg · F.O. Nestle
Fallbericht zur Therapie mit Granulozyten stimulierendem Faktor beim diabetischen Fuß 327
- N. Fackel · E.G. Jung · C. Bayerl
Postherpetisches Erythema exsudativum multiforme mit perinävaler Anordnung der kokardenförmigen Effloreszenzen 331
- G. Bloss · M.A. Ebisch · M. Kunz · G. Gross
Bilateraler asymmetrischer Zoster im Jugendalter 335
- M.H. Krause · J. Ulrich · H. Gollnick
Systematisierter Naevus sebaceus mit multiplen sekundären Neubildungen als Leitsymptom des Schimmelpenning-Feuerstein-Mims-Syndroms 339