



**Segmentale Typ-2-Manifestation autosomal dominanter Hautkrankheiten.**

Oben: **Dichotomieregel auf einen Blick. Von links nach rechts: gesunder Embryo; diffuse Manifestation einer autosomal dominanten Genodermatose; segmentale Typ-1-Manifestation; segmentale Typ-2-Manifestation**

Unten: **Segmentale Typ-2-Manifestation bei kutaner Leiomyomatose (siehe auch Beitrag von R. Happle, S. 283 in diesem Heft)**

## Anfragen aus der Praxis

T.M. Zollner · H. Schöfer

**Isoliert positiver Antistreptolysintiter bei chronischer Urtikaria oder Psoriasis vulgaris**

344

## Dermatologie in Kunst und Geschichte

N. Haas · H. Barthelmes

**Ernst Schweningen, Leibarzt des Reichskanzlers und Direktor der Charité-Hautklinik 1884–1902**

346

## Berichte und Briefe

T. Gambichler · S. Rotterdam · P. Altmeyer · K. Hoffmann

**Stellungnahme zur Arbeit von H. Breuninger, C. Garbe und G. Rassner: Shave-Exzision von melanozytären Nävi der Haut – Indikation, Technik, Ergebnisse. Der Hautarzt (2000) 51:575–580**

352

H. Breuninger

**Schlusswort**

353

## Jubilar

W. Tilgen

**Professor Dr. Detlef Petzoldt zum 65. Geburtstag**

354

## Wie lautet Ihre Diagnose?

Z. Gaigl · L. Becker · M. Goebeler

**Schwellung und Rötung des rechten Beins bei einem 62-Jährigen**

357

## Fort- und Weiterbildung

W. Kempf · S. Lautenschlager

**Infektionen mit dem Varizella-zoster-Virus**

359

## DDG aktuell

**Mitteilungen der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft**

379

## Verschiedenes

**Gehört – Gelesen – Nachgefragt**

386

**Buchbesprechungen**

311, 334, 338

**Kongreßkalender**

A 35