

Schwerpunkt Allergie & Asthma



Atopiker-Karrieren verhindern: Primär- und Sekundärprävention atopischer Erkrankungen, wie beispielsweise des Asthma bronchiale, spielen in der Kinderarztpraxis eine immer größere Rolle.

22

„State of the Art“

Das Management der atopischen Dermatitis .....22

Atopie-Prävention

Den „allergischen Marsch“ stoppen: Eine Herausforderung für den Kinderarzt .....24

Spezifische Immuntherapie

Auch bei Asthma bronchiale vielversprechend .....26

Patienten-Kompetenz stärken

Chancen durch Neurodermitis-Schulung .....28

Praxis Heute

Stürzen die Budgets bei der Asthma-Therapie? .....34

Praxis Plus

„pina“ – der heiße Draht bei Fragen zur Allergie .....35

ÄP-Service

Termine, Adressen und Infos aus dem Internet .....36



Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich Pädiatrie finden Sie auf unserer Homepage <http://www.aerztlichepraxis.de>

Foto: Röper

Ihre Empfehlung für Patienten!

Vor dem Pflaster Octenisept®



**schmerzfrei**

**farblos**

**aus der Apotheke**

**praktisch für unterwegs**

**ÖKO-TEST 7/2000:**  
Von 23 getesteten Mitteln zur Wundbehandlung erhielten 11 die Bewertung „nicht empfehlenswert“, 5 „weniger empfehlenswert“, 6 „eingeschränkt empfehlenswert“ und nur 1 das Prädikat „empfehlenswert“: Octenisept®



Schülke & Mayr

Octenisept Wund-Desinfektion ■ Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Octendindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol 2,0 g, (3-Cocostettsäureamidopropyl)-dimethylammoniumacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser, Natriumhydroxid.  
■ Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung ■ Gegenanzeigen: Octenisept® sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Für die Anwendung bei Kindern unter 8 Jahren liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor ■ Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Bei Spülungen in der Mundhöhle verursacht Octenisept® vorübergehend einen bitteren Geschmack ■ Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Octenisept® sollte nicht in größeren Mengen verschluckt werden oder in größeren Mengen, z. B. durch versehentliche Injektion, in den Blutkreislauf gelangen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.  
Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Zum Kennenlernen einfach das 50-ml-Muster abfordern!

– Nur eine Anforderung pro Jahr möglich –

Schülke & Mayr GmbH • 22840 Norderstedt  
Telefon 040-521 00 666 • Telefax 040-521 00 253

[www.schuelke-mayr.com](http://www.schuelke-mayr.com)  
e-mail: [mail@schuelke-mayr.com](mailto:mail@schuelke-mayr.com)

Praxisstempel

C O U P O N

ÄPP-C-04/01

Unterschrift