




**UNSER TITELBILD**

*Längsschnittlinie der mit  
schiefen Incision in Korrektur  
einer Supinationskontraktur am  
linken Arm, die zu einer unentzün-  
deten Narbe führt.*



*Patientinnen mit dem Relativ-chies  
gynäkológischen Mastenias haben  
nur noch eine Meinung zu leben.*



*Nur mittels Nanokolloid kommt es  
in einem Zeitraum von 120 min p.i.  
von ap. 700 Retention im Bereich  
des Wundheilungsprozesses.*

plastische chirurgie

**Ziel: Bessere Narben** ..... 10

**Messungen an der Haut als Grundlage für die Wahl optimaler Incisionslinien**

Univ.-Prof. Dr. Hanno Millesi, Dr. Dagmar Millesi, Tarkan Basar, Dr. Roland Reihnsner, Wien

onkologie

**Geänderte Ziele** ..... 20

**Palliative Therapiestrategien in der gynäkologischen Onkologie**

OA DDr. Anton-H. Graf, Salzburg

nuklearmedizin

**Einfach, sicher und verlässlich** ..... 28

**Darstellung des SLN mittels radioaktiver kolloidaler Tracer beim Mammakarzinom –**

**Physiologische Grundlagen, Methodik und Limitationen**

Univ.-Doz. Dr. Hans-Jürgen Gallowitsch, OA Dr. Jörg Lutz, Klagenfurt und Linz

innere Medizin

**Opioide bei starken chronischen Schmerzen** ..... 32

Univ.-Doz. Dr. Rudolf Likar, Univ.-Prof. Dr. Wilfried Ilias und Univ.-Prof. Dr. Günther Bernatzky,  
Klagenfurt, Wien und Salzburg

**panorama** ..... 6

**aktuell** ..... 42

**veranstaltung** ..... 41

**produkte** ..... 50

**impressum** ..... 13