

Schwerpunkt Diabetes



**Stark im Kommen:
Immer mehr Kinder und
Jugendliche mit Diabetes
mellitus Typ 1 profitieren
von den Vorteilen einer
Insulinpumpen-Therapie**

ab Seite **22**

Insulinpumpen-Therapie:

Heute schon bei Säuglingen möglich22

Diabetes-Screening nicht sinnvoll

Interview mit Kinderdiabetologin Olga Kordonouri23

Typ-2-Diabetes

Der „Alterszucker“ unterwegs in die Kinderzimmer24

Ängste abbauen, Überforderung vermeiden

Psychologische Aspekte der Initialbehandlung26

Praxis Heute

Insuline sind eine Praxisbesonderheit29


Praxis Plus

Vorsorgekur macht Kinder Diabetes-fit30

ÄP-Service

Termine, Adressen und Infos aus dem Internet31


Bitte beachten Sie auch unser eXtra mit dem Titel „Reinigung von Babyhaut“



**Täglich aktuelle Meldungen
aus dem Fachbereich Pädiatrie
finden Sie auf unserer
Homepage im Internet unter
http://www.aerztlichepraxis.de**

Ihre Empfehlung für Patienten!

**Vor dem Pflaster
Octenisept®**



schmerzfrei

farblos

aus der Apotheke

praktisch für

unterwegs

ÖKO-TEST 7/2000:
Von 23 getesteten
Mitteln zur Wundbe-
handlung erhielten 11 die Bewertung
„nicht empfehlenswert“, 5 „weniger
empfehlenswert“, 6 „eingeschränkt
empfehlenswert“ und nur 1 das Prädikat
„empfehlenswert“: Octenisept®



Schülke & Mayr

Octenisept Wund-Desinfektion ■ Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Octendindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol 2,0 g, (3-Coccosfettsäureamidopropyl)-dimethylammonioacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser, Natriumhydroxid.

■ Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung ■ Gegenanzeigen: Octenisept® sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Für die Anwendung bei Kindern unter 8 Jahren liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor ■ Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Bei Spülungen in der Mundhöhle verursacht Octenisept® vorübergehend einen bitteren Geschmack ■ Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Octenisept® sollte nicht in größeren Mengen verschluckt werden oder in größeren Mengen, z. B. durch versehentliche Injektion, in den Blutkreislauf gelangen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

**Zum Kennenlernen einfach
das 50-ml-Muster abfordern!**

— Nur eine Anforderung pro Jahr möglich —

Schülke & Mayr GmbH • 22840 Norderstedt
Telefon 040-521 00 666 • Telefax 040-521 00 253
www.schuelke-mayr.com
e-mail: mail@schuelke-mayr.com

Praxisstempel

C O U P O N

ÄPP-C-08/01

Unterschrift