


| | | |
|--|--------|--|
| Editorial | | |
| Nierenkolik effektiv behandeln | 3 | |
| Urologie international | | |
| Blasenkrebs | | |
| Hoch dosiertes Epirubicin senkt Rückfallquote | 5 | |
| Prostatakarzinom | | |
| PC-SPES hilft bei Androgen-unabhängigen Tumoren | 5 | |
| Penisverkrümmung | | |
| Androstanolon hilft nur in jungen Jahren | 6 | |
| Übersicht | | |
| Staging urologischer Tumoren | | |
| Was sind die aussagefähigsten Verfahren? | 8 | |
| Interview | | |
| Innovative Tumorablationstechnik | | |
| Hyperthermie von Lebertumoren mittels Radiofrequenz | 12 | |
| Blickpunkt Praxis | | |
| Erkrankungen der Prostata – eine neue Volkskrankheit | | |
| Fallzahlen der Urologen stark im Anstieg ... | 14 | |
| Kasuistik | | |
| Mündungsanomalien des Ureters | | |
| Hydronephrose bei Harnleiterektopie | 16 | |
| Prisma | | |
| Nutzen aus der Gentechnik | | |
| Erleichterte Behandlung der renalen Anämie | 20 | |
| Aktiviertes Protein C | | |
| Ausweg aus einem fatalen Krankheitsprozess | 20 | |
| Benigne Prostatahyperplasie | | |
| Kaskadentherapie vermeiden | 21 | |
| Hormonrefraktäres Prostatakarzinom | | |
| Paradigmenwechsel in der Chemotherapie | 22 | |
| Therapie von Feigwarzen | | |
| Medikamentöse Immuninduktion bekämpft Kondylome | 22 | |
| Tumorhypoxie | | |
| Ein prognostischer Faktor für die lokale Kontrolle und das Überleben | 23 | |
| Impressum | 17 | |
| extracta special | 18, 24 | |
| Kurz notiert | 23 | |

extracta
urologica
fragt



Das Vorhandensein einer Polararterie beeinflusst das operative Vorgehen bei Ureterabgangsstenose im Erwachsenenalter. Wie lässt sich eine solche Polararterie am geschicktesten nachweisen:

1. mittels Spiral-CT
2. mittels Angiographie
3. mittels Dopplersonographie?

Antwort auf Seite 13