

So können Sie Ihren Patienten die Lebensqualität erhalten. .... 14

### Milz mit Kaviar aufgewogen

Lacrosse-Spieler hatte einen findigen Hausarzt. .... 19

### Endoskopiker treiben's bunt

Spielerei oder erleichterte Krebsdiagnose? ..... 24

### Urologie in Hausarztthand

Expertenrat fürs Kathetern und Hodenuntersuchen. .... 44

### Kirchentour ins Hinterland

Reisetipp für Fachwerkfreunde. .... 46

## Politik und Perspektiven

### Kassen sitzen auf Morbiditätsdaten

So bleibt die Vergütung nach Bedarf Zukunftsmusik. .... 34

### Das Leiden der Physikuskandidaten

Angehende Ärzte kämpfen mit der medizinischen Psychologie. .... 35

## Praxisführung und Geld

### Gesundheitssystem ist kein Selbstbedienungsladen

Beim Gesundheitstag lernen Patienten IGeL und Check kennen. .... 49

### Flüssig bleiben, Sicherheit gewinnen

Unser „Praxis und Finanzen special“ zeigt Wege zur finanziellen Sicherheit. .... 54

etwas, was sie nicht können. Oder ehrlichen kollegialen Ra

# DUAL ins Ziel



## Doppelt wirksam bei

- an Prostata und Blase
- schnell und anhaltend
- stark und verträglich



Yamanouchi Pharma GmbH, Im Breitspiel 19, 69126 Heidelberg

**Omnice® 0,4.** Wirkstoff: Tamsulosinhydrochlorid

**Zusammensetzung:** 1 Retardkapsel enthält: Tamsulosinhydrochlorid 0,4 mg (entspricht Tamsulosin) sowie mikrokristalline Cellulose, Poly[(acrylsäure, methacrylsäure)(ethyl, methylmethacrylat)] (1:1), Polysorbat 80, Natriumdodecylsulfat, Triacetin, Calciumstearat, Talk, Farbstoffe E 132, E 172 sowie Titandioxid E 171. **Anwendungsgebiete:** Behandlung von Symptomen der benignen Prostatahyperplasie wie Blasenentleerungsstörungen, Harntröpfchen, Pollakisurie, Nykturie. **Gegenanzeigen:** Omnice® 0,4 darf nicht angewandt werden bei Unverträglichkeit gegen Tamsulosinhydrochlorid oder einen der anderen Inhaltsstoffe des Präparats, orthostatischer Dysregulation, schwerer Leberinsuffizienz. Die Behandlung von Patienten mit Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-Clearance < 10 ml/min) darf nur mit besonderer Vorsicht erfolgen, da bisher keine Erfahrungen an solchen Patienten vorliegen. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich retrograde Ejakulation, seltener Kopfschmerzen, Schwäche, orthostatische Hypotonie, Heiserkeit, Rhinitis. In Einzelfällen ist es möglich, daß es unter der Therapie mit Omnice® 0,4 zu einem Blutdruckabfall und in dessen Folge selten zu Synkopen kommt. Bei den ersten Anzeichen einer orthostatischen Hypotonie sollte sich der Patient setzen oder hinlegen, bis die Symptome verschwunden sind. Intestinale Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Obstipation können getreten. Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag, Pruritus und Urtikaria können auftreten. Angioödem wurden selten und Priapismus in Einzelfällen beobachtet.

**Verschreibungspflichtig.**

Stand: September 2000



## Hier ist Platz für Ihre Meinung ...

Redaktion Medical Tribune  
Postfach 42 40  
65032 Wiesbaden  
Fax (06 11) 97 46-304

@ E-Mail: kontakt@medical-tribune.de

