

Inhalt

Zum Thema

Contents

Experimentelle Studien

- 616** Nagel, E., K. Münch, W. Vilser:
Durchmesserbestimmung von
Netzhautgefäßabschnitten in digi-
talen Fundusfotos – Eine
klinische Studie zur Methodik und
Reproduzierbarkeit

*Automatische hardwareunabhängige Be-
stimmung des Durchmessers retinaler
Arterien und Venen ist mittels spezieller
Softwarealgorithmen einfach und genau
möglich.*

- 616** Nagel, E., K. Münch, W. Vilser:
Measurement of the diameter of
segments of retinal branch vessels
in digital fundus images – An
experimental study of the method
and reproducibility

Kasuistik

- 621** Hafner, A., B. Seitz:
Durch falsche normale Applana-
tionstonometrie nach Goldmann
maskiertes primär chronisches
Offenwinkelglaukom bei extremer
Cornea plana

*Pro 3 Dioptrien vermindeter Hornhaut-
brechkraft Addition von ca. 1 mm Hg.
Rechnerische Korrektur: Das Schiötz-
Tonometer misst genauer bei Cornea
plana.*

Case Report

- 621** Hafner, A., B. Seitz:
Masked primary open angle glau-
coma in cornea plana by wrongly
too low applanation tonometry –
a case report

- 626** Spraul, C. W., H. Gäckle, G. K. Lang:
Maligne Transformation eines
Aderhautnaevus 6 Jahre nach
Bestrahlung eines davon entfernten
Aderhautmelanoms: Ein Fall-
bericht sowie Literaturübersicht

*Neu aufgetretene Zweitmelanome, die
sich nicht in unmittelbarer Nähe vorbe-
strahlter Primärtumoren befinden, sind
selten. Bei der Nachuntersuchung be-
strahlter Tumoren sollte dem bestrahlten
Areal und auch dem gesamten Auge
größtmögliche Aufmerksamkeit gewid-
met werden, um entstehende Zweittumo-
ren so früh wie möglich zu erkennen.*

- 626** Spraul, C. W., H. Gäckle, G. K. Lang:
Malignant transformation of a
choroidal nevus 6 years after
brachytherapy of a non-contiguous
choroidal melanoma – a case
report and review of literature

Diagnostisches Forum

- 632** Spraul, C. W., Gerhard K. Lang:
Diffuser melanozytärer Nävus der
Iris mit absolutem Glaukom

*Ein diffuses infiltratives Wachstum eines
melanozytären Prozesses im Bereich des
Ziliarkörpers sowie des Kammerwinkels
mit sekundärer Drucksteigerung kann
auch bei histologisch benignen Prozessen
vorkommen. Die Diagnosesicherung
erfordert deshalb eine Biopsie des Pro-
zesses.*

Diagnostic Forum

- 632** Spraul, C. W., Gerhard K. Lang:
Melanocytic nevus with diffuse
extension and absolute glaucoma

602 Erratum

602 Erratum

Abstracts: <http://www.onjoph.com>

Titelfoto:

„Postoperative Trübung von Hinterkam-
merlinsen – eine Übersicht“,
J. M. Schmidbauer et al.,
Seite 586 in diesem Heft

Jetzt online!

www.thieme-connect.de
www.thieme.de/klimo