

JOURNAL FÜR UROLOGIE UND UROGYNÄKOLOGIE

Nr. 4/2001, 8. Jahrgang

G. Lunglmayr Editorial	5
J. Pannek, M. Hohenfellner, G. Hutschenreiter, U. Bötzel, J. W. Thüroff Therapie der Detrusorhyperreflexie durch sakrale Rhizotomie	7
St. Machtens, St. Ückert, A. Stanarius, A. Becker, M. Kuczyk, Ch. G. Stief, U. Jonas, G. Wolf Ist die Sekretion der humanen Samenblase durch Stickoxid (NO) reguliert?	15
W. J. Reiter, M. Grbovic, M. Eisenmenger, A. Pycha Hormonprofilveränderungen unter DHEA-Substitution bei Patienten mit erektiler Dysfunktion	23
Buchbesprechung	28
Für Sie gelesen	29
Pharma-News	30
Impressum, Hinweise für Autoren	38

Herausgeber:

F. Fischl, Wien

Redaktion Urologie:

H. Heidler, Linz

M. Rauchenwald, St. Pölten

Redaktion Urogynäkologie:

E. Hanzal, Wien

H. Kölbl, Halle

Editorial Board:

J. Eberhard, Frauenfeld

J. Frick, Innsbruck

W. A. Hübner, Korneuburg

W. Ludvik, Wien

G. Lunglmayr, Mistelbach

H. Madersbacher, Innsbruck

E. Petri, Schwerin

G. Ralph, Bruck/Mur

P. Riss, Mödling

FACHKURZINFO

ixense® 2 mg Sublingualtabletten (2, 4 und 8 Stück)

ixense® 3 mg Sublingualtabletten (2, 4, 8 und 12 Stück)

Wirkstoff: Apomorphin. **Zusammensetzung:** Jede Sublingualtablette enthält 2 mg oder 3 mg Apomorphinhydrochlorid, entsprechend 1,71 mg bzw. 2,56 mg Apomorphin, Hilfsstoffe: Mikrokristalline Zellulose, Hypromellose, Zitronensäure, Magnesiumstearat, Ascorbinsäure, Dinatriumedetat, Siliciumdioxid, Eisen(III)-oxid (E172), Acesulfam-Kalium, Orangen-Minzaroma (WONF WL-28499), Mannitol. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung der erektilen Dysfunktion, welches die Unfähigkeit ist, eine ausreichende Erektion des Penis für einen befriedigenden Geschlechtsverkehr zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Damit ixense wirken kann, ist eine sexuelle Stimulation erforderlich. Ixense ist nicht zur Anwendung bei Frauen angezeigt. **Gegenanzeigen:** Bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile der Sublingualtablette, bei Patienten mit schwerer instabiler Angina pectoris, kürzlichem Myokardinfarkt, schwerer Herzinsuffizienz oder Hypotonie und anderen Erkrankungen, die eine sexuelle Aktivität nicht ratsam erscheinen lassen. **Abgabe:** Rezept- und apothekenpflichtig.

Z.Nr.: ixense® 2mg: EU/1/01/181/001 - 003; ixense® 3mg: EU/1/01/181/004 - 007. **Zulassungsinhaber:** Takeda Europe R & D Centre Ltd, London, Großbritannien.

Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. Weitere Informationen erhalten Sie von **Takeda Pharma GmbH**, 1070 Wien, Seidengasse 33-35, Tel: 01/ 524 40 64, Fax 01/ 524 40 66.