

K. Huber Brief des Herausgebers	II
H. Frank Editorial: Stellenwert der Magnetresonanz in der kardialen Diagnostik	339
M. Czerny, D. Zimpfer, V. Sahin, J. Kilo, H. Baumer, S. Sandner, A. Zuckermann, E. Wolner, M. Grimm Ergebnisse der Re-Bypasschirurgie mit und ohne Herz-Lungen-Maschine	341
H. Scheffer, M. de Groot, H. Remkes, C. Weidensteiner, M. Meininger, S. Neubauer, M. Horn ²³ Na-Magnetresonanzspektroskopie-Untersuchungen zum Verlauf der Narbenentwicklung nach Myokardinfarkt	345
Rubriken	
Herzmedikamente: Prähospital Thrombolyse des akuten Myokardinfarkts mit Reteplase – Erfahrungen des NAW-LKH-Universitätsklinikums Graz	349
EKG-Beispiel	352
Kardiologie aktuell	353
Pro und Kontra	358
Kongreßbericht	360
Leserbrief	362
Für Sie gelesen	363
Pharma-News	367
Bilder der Kardiologie	372
Medizintechnik – Produkte – Informationen	373

Titelbild: Myxom im linken Vorhof. Aus: Th. Weber, J. Auer, R. Berent, B. Eber, J Kardiol 2001; 8: 353–7.

IMPRESSUM

Herausgeber/Chefredaktion:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernd Eber
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern,
II. Interne Abteilung mit Kardiologie,
A-4600 Wels, Grieskirchner Straße 42,
Tel. 07242/415-2215,
Fax 07242/415-3992,
e-mail: b.eber@t-online.at

Prof. Univ.-Dr. Kurt Huber
Univ. Klinik für Innere Medizin II
Abt. für Kardiologie
A-1090 Wien, Währinger Gürtel 18–20,
Tel. 01/40400-4623,
Fax 01/40400-4613,
e-mail: kurt.huber@univie.ac.at

**Verleger, Produktion, Anzeigen,
Vertrieb:** Krause & Pachernegg GmbH,
Verlag für Medizin und Wirtschaft,
A-3003 Gablitz, Mozartgasse 10,
Tel. 02231/61258-0, Fax DW 10.

Layout:
Krause & Pachernegg GmbH,
M. Hegedüs, Mag. F. Stadler

Druck:
Druckberatung Demczuk
A-3004 Ried am Riederberg

Verlags- und Erscheinungsort:
3003 Gablitz.

Erscheinungsweise: 10 x im Jahr.

Abonnement: öS 550,-,
im Ausland zuzüglich Porto- und Auslands-
überweisungsspesen.

Grundlegende Richtung: Kardiologische Fachzeit-
schrift zur Information und Weiterbildung, Veröffentli-
chung von wissenschaftlichen Originalarbeiten sowie
einschlägigen Berichten und Nachrichten aus dem In-
und Ausland.

Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht unbe-
dingt die Meinung der Redaktion wieder, sondern
fallen in den Verantwortungsbereich der Autoren.

Angaben von Dosierungen, Anwendungshinweisen,
Applikationsformen usw. erfolgen außerhalb der
Verantwortung der Redaktion und des Verlages und
sind vom jeweiligen Anwender im Einzelfall auf
ihre Richtigkeit zu prüfen. Eine Markenbezeichnung
kann geschützt sein, auch wenn beim Namen kein
Hinweis auf ein Schutzrecht angegeben ist.

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge
sind urheberrechtlich geschützt. Übersetzung,
Vervielfältigung, Nachdruck, Reproduktion sowie
Einspeicherung in elektronische Systeme ausschließ-
lich mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

Fachinformation zum Inserat auf Seite 344

Dilatrend 6,25 mg-Tabletten, Dilatrend 12,5 mg-Tabletten, Dilatrend 25 mg-Tabletten: Zusammensetzung (arzneilich wirksame Bestandteile) 1 Tablette enthält 6,25 mg oder 12,5 mg oder 25 mg Carvedilol.
Anwendungsgebiete: Arterielle Hypertonie. Chronisch-stabile Angina pectoris. Chronische Herzinsuffizienz NYHA II und III zusätzlich zur konventionellen Basistherapie mit Diuretika, ACE-Hemmern und/oder Digitalis.
Gegenanzeigen: • Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Präparates • Erregungsbildungs- und -leitungsstörungen (Sick-Sinus-Syndrom, SA-Block, AV-Block 2. und 3. Grades), außer bei Patienten mit Schrittmacher • ausgeprägte Hypotonie (systolischer RR < 85 mmHg) • hochgradige Bradykardie (Herzfrequenz < 50/min) • unbehandelte Herzinsuffizienz • kardiogener Schock • Prinzmetal Angina • pulmonale Hypertonie, Cor pulmonale • Asthma bronchiale • chronisch-obstruktive Atemwegserkrankungen • schwer eingeschränkte Leberfunktion • gleichzeitige Gabe von MAO-Hemmern • gleichzeitige i.v. Gabe von Verapamil und Diltiazem • Schwangerschaft und Stillperiode • Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (aufgrund fehlender Untersuchungen) **Hilfsstoffe:** Lactose, Magnesiumstearat, Polyvidon, Saccharose, hochdisperses Siliciumdioxid, gelbes und rotes Eisenoxid (E 172). **Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers:** Roche Austria GmbH, Engelhorngasse 3, 1211 Wien · Tel: (01) 27739 · Fax: (01) 27739 - 254.
Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rp, apothekenpflichtig. **Wirkstoffgruppe:** Alpha- und Betablocker. **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sowie Nebenwirkungen sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.**