

Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie

Heft 4 Band 205
Juli/August 2001

Editorial

- 125 Rath, W., L- Heilmann**
Thromboembolische Komplikationen – häufigste Todesursache nach Kaiserschnitt

Übersicht

- 128 Heilmann, L., F.-G. v. Tempelhoff, S. Gerhold, W. Rath**
Der Einfluss thrombophiler Faktoren auf thromboembolische und andere Schwangerschaftskomplikationen

Originalarbeiten

- 137 David, M., M. Nierhaus, B. Schauß, K. Vetter**
Prophylaktische intravenöse Nitroglycerinapplikation bei der Sectio caesarea zur Erleichterung der Entwicklung von Kindern zwischen 500 und 1500 g – gibt es negative Effekte für das Neugeborene?
- 143 Artmann, A., R. Schuchardt, J. Gnirs, M. Schelling, K. T. M. Schneider**
Der totale Muttermundverschluss – eine effiziente Maßnahme bei prolabierender Fruchtblase im Bereich der extremen Frühgeburtlichkeit?
- 147 Raio, L., F. Ghezzi, E. Di Naro, H. Brühwiler, K. P. Lüscher**
Kürzere Geburtsdauer nach Einleitung mit Misoprostol

Kasuistik

- 152 Ochsenbein-Imhof, N., G. Hebisch, T. Stallmach, C. Breymann, A. Huch**
Zweizeitige Geburt nach spontanem Blasensprung und Spätabort des ersten Mehrlings bei konservativem Management

Hochschulmedizin

- 156 Niethammer, D.**
Die Hochschulmedizin am Beginn des 21. Jahrhunderts – Der Versuch eines Blickes in die Zukunft

Empfehlung

- 162 Rempen, A.**
Standards zur Ultraschalluntersuchung in der Frühschwangerschaft – Empfehlung der DEGUM-Stufe III der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (Sektion Gynäkologie u. Geburtshilfe) und der ARGUS (Arbeitsgemeinschaft für Ultraschalldiagnostik der DGGG)

Kongresskalender **166**

Preisverleihung **142**

Editorial

- 125** Thromboembolic Complications – The Most Frequent Mortality Cause after Caesarean Section
Rath, W., L- Heilmann

Review Article

- 128** The influence of thrombophilic factors on the incidence of deep vein thrombosis and pregnancy complications
Heilmann, L., F.-G. v. Tempelhoff, S. Gerhold, W. Rath

Original Contributions

- 137** Prophylactic intravenous nitroglycerin application during cesarean section to facilitate fetal extraction of preterm infants weighing 500 to 1500 g: Are there negative consequences for the neonates?
David, M., M. Nierhaus, B. Schauß, K. Vetter
- 143** Total cervix occlusion – an efficient method in cases with bulging membranes during extreme prematurity?
Artmann, A., R. Schuchardt, J. Gnirs, M. Schelling, K. T. M. Schneider
- 147** Shorter delivery time after labor induction with Misoprostol
Raio, L., F. Ghezzi, E. Di Naro, H. Brühwiler, K. P. Lüscher

Case Report

- 152** Prolonged membrane rupture and delayed delivery of the second twin after expectant management
Ochsenbein-Imhof, N., G. Hebisch, T. Stallmach, C. Breymann, A. Huch

Medicine at University Level

- 156** University-Level Medicine at the Onset of the 21st Century
Niethammer, D.

Recommendation

- 162** Standards of Sonographic Examination in Early Pregnancy – Recommendations for the German DEGUM Stage III by the German Society for the Use of Ultrasound in Medicine (Gynaecological and Obstetrics Section) (DEGUM) and by The Working Team for Ultrasound Diagnostics in the German Society for Gynaecology and Obstetrics (DGGG)
Rempen, A.

Congress Announcements **166**

Prize Award **142**

Thieme 

www.thieme-connect.de

www.thieme.de/zgn