

Spitlernagel wieder reißfest

Wie Sie für schöne Hände sorgen. 18

Pflanzen an die Psyche!

Natürliche Hilfen bei Depression, Schlafstörung und Angst. 34

Zappelphilipp unter der Glocke

Wird Methylphenidat zu oft rezeptiert? 36

Sextod lauert überall

Auch das Ehebett ist nicht mehr sicher! 52

Politik und Perspektiven

Ärzte im Pharma-Geschäft

Sind Kollegen als Unternehmensgründer ein Fall für die Justiz? 25

Hepatitis im Ärzteblut

Wie gefährlich infizierte Chirurgen sind. 28

Praxisführung und Geld

Bericht für Mini-Honorar

Darf BG wirklich die Preise diktieren? 43

Run auf den IGeL

Aufklärung trotzdem gescheitert! 44

KVen auf Ärztehatz

„Doppel-Patienten“ in Gemeinschaftspraxis nicht mehr geduldet. 47

Mit dem Passwort doc finden Sie in www.medical-tribune.de spezielle Informationen für Ärzte.

am dritten Tag trotz diverser Pillen und Tropfen Ihnen etwas über Fieber, anhaltende Bauchkrämpfe und zunehmende Mattigkeit vorschwallen. Bis Sie dann Typhus, Cholera, Hepa-

Prinzip haben Sie natürlich weitestgehend recht.

Michael Andor
Arzt für Allgemeinmedizin
Groß-Gerau

Vertraut!
Seit Jahren das meistverordnete Antiarrhythmikum in Deutschland

Wirksam!
Dokumentierter klinischer Wirksamkeitsnachweis. Publiziert in:
JACC 29,5 (April 1997): 1028 - 34

Erstattungsfähig!
Gemäß Arzneimittel-Richtlinien



Das physiologische Antiarrhythmikum

 **Tromcardin®**
Kalium-/ Magnesium-Aspartat

- ✓ beugt proarrhythmischen Komplikationen vor
- ✓ verringert signifikant ventrikuläre Extrasystolen


Tromcardin® forte magensaftresistente Tabletten. **Zusammensetzung:** 1 magensaftresistente Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: 360,42 mg racemisches Kaliumhydrogenaspartat-Hemihydrat (= 2 mmol = 2 mval = 78,2 mg Kalium), 360,57 mg racemisches Magnesiumhydrogenaspartat-Tetrahydrat (= 1 mmol = 2 mval = 24,3 mg Magnesium). Sonstige Bestandteile: Povidon, D-Glucitol, Hypromellose, Magnesiumstearat, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer 1:1, Talkum, Macrogol 6000, Natriumhydroxid, Antischaumemulsion SE 2, Gelborange S (Farbstoff E 110). **Anwendungsgebiete:** Kalium-/ Magnesium-Mangelsyndrom; Herzrhythmusstörungen; Herzinfarkt-Prophylaxe und -Therapie; Herzinsuffizienz; Digitalis-Intoxikation und -Intoleranz, besonders beim Altersherzen. **Gegenanzeigen:** Bei schweren Störungen der Nierenfunktion, bei Hyperkaliämie und Hypermagnesiämie sowie AV-Block III. Grades sollen Tromcardin forte magensaftresistente Tabletten nicht angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Bei Einnahme höherer Dosen von Tromcardin forte magensaftresistente Tabletten kann häufiger Stuhlientleerung eintreten.

Darreichungsform, Packungsgrößen und Preise:
OP mit 50 Tabletten N2 DM 18,91; OP mit 100 Tabletten N3 DM 34,65 Anstaltspackungen. **Weitere Darreichungsformen:** Tromcardin magensaftresistente Tabletten, Tromcardin Injektionslösung, Tromcardin E Infusionslösung und Tromcardin K 120 Infusionslösung. Trommsdorff GmbH & Co. KG Arzneimittel · 52475 Alsdorf. Stand der Information: Januar 2000

seit 1797  **Trommsdorff**
Arzneimittel

Hier ist Platz für Ihre Meinung ...

Redaktion Medical Tribune
Postfach 42 40
65032 Wiesbaden
Fax (06 11) 97 46-304
@ E-Mail: kontakt@medical-tribune.de



Akne Ha ges

Zum Beitr
Akne in de
MT 36/01,

An ME
Zu Ihre
Bandschei
Krämer, C
die in Boc
bedingte
ge, 1997,
de Zwisch
beim Eml
mit Blutg
fäße gelan
lus fibro
Bandschei
ren radial
den inter
dringen a

Der Gi Sch

Zum Beitr
karte hat
neimittelg
werden",

An ME
Nach e
ger Refo
einanderr
ter in der
jetzt ans
Schwachs
in Gestal
Dieses bi
ment set
Fehlentsc