

## Aus dem Inhalt

### Medizin

#### Fast-Ertrunkenen Leben einhauchen

Beatmen ist das A und O, Wasser entfernen dagegen zweitrangig. .... 3

#### Heisere Stimme zum Klingen bringen

Die richtige Schleimhautpflege ölt den Kehlkopf. .... 17

#### Demonstrations-Hypoglykämie

Für ihre Gattin spritzen sich liebe Patienten sogar Insulin! .... 6

#### Riss im Meniskus

Unser Gastautor Dr. Romain Seil beschreibt den aktuellen Stand der Rekonstruktionstechnik. .... 10

#### Prostata-Karzinom im Alter

Wie viel Therapie braucht Ihr Patient? .... 12

#### Piercing zerstört Ohrmuschel

Hohe Löcher sind des Knorpels Feind. .... 24

#### Natürlicher Tod oder Mord?

Mir könnte man ein Verbrechen unterschieben, räumt MT-Kolumnist Dr. Drews ein. .... 38

#### Impressum

## Politik und Perspektiven

#### SPD setzt auf Einkaufsmodell

Die Ideen zur grundlegenden Gesundheitsreform. ....

## Kostentreiber Internist?

# Überhebliche Allesverpfuscher Patienten

Nur Allgemeinärzte sind gute Hausärzte, Internisten dagegen sind dafür nicht ausgebildet und treiben nur die Kosten, behaupten manche in der derzeitigen Diskussion. Hierzu ein pointierter Leserbrief aus Leipzig:

An MEDICAL TRIBUNE  
Nach der Auflösung der Diabetesambulanzen hatte sich die Zahl der Patienten, welche mit entgleis-

tem Diabetes mellitus inklusive diabetischem Koma in meine damalige Klinik aufgenommen wurde, verdzwanzigfacht. Trotz meiner unbe-

**isoket® retard 120 mg**; Wirkstoff: Isosorbiddinitrat (ISDN). Verschreibungspflichtig. **Zusammensetzung**: 1 Retardkapsel isoket® retard 120 mg enthält 120 mg ISDN. Sonst. Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Ethylcellulose, Saccharose, Schellack, Maisstärke, Talkum, Kapselhülle: Gelatine, Titandioxid (E 171), Eisenoxide (E 172). **Anwendungsgebiete**: Prophylaxe und Langzeitbehandlung der Angina pectoris. **Gegenanzeigen**: Überempfindlichkeit gegenüber ISDN, anderen Nitroverbindungen oder sonstigem Bestandteil, akutes Kreislaufversagen (Schock, Kreislaufkollaps), kardiogener Schock, ausgeprägte Hypotonie (syst. Blutdruck < 90 mmHg). **Während der Behandlung keine Phosphodiesterase-5-Hemmer, z.B. Sildenafil, einnehmen, da es zu erheblichem Blutdruckabfall kommen kann.** Besonders sorgfältige Überwachung bei: HOCM, konstriktiver Perikarditis, Perikardtamponade, niedrigen Füllungsdrücken (z.B. akuter Herzinfarkt, Linksherzinsuffizienz, Blutdrucksenkung unter 90 mmHg vermeiden), Aorten- und /oder Mitralklappenstenose, Neigung zu orthostatischen Kreislaufregulationsstörungen, erhöhtem intrakraniellen Druck. **isoket® retard 120 mg ist nicht geeignet zur Behandlung des akuten Angina-pectoris-Anfalls, Schwangerschaft und Stillzeit; strenge Indikationsstellung.** **Nebenwirkungen**: Häufig bei Behandlungsbeginn Auftreten sog. Nitratkopfschmerzen, die meistens nach einigen Tagen bei weiterer Einnahme abklingen. Gelegentlich bei der Erstanwendung, aber auch bei Dosiserhöhung, Abfall des Blutdrucks/ oder orthostatische Hypotension, zum Teil mit reflektorischer Erhöhung der Pulsfrequenz, Benommenheit, Schwindel- und Schwächegefühl. Selten Übelkeit, Erbrechen, Flush, allergische Hautreaktionen; Verstärkung der Angina-pectoris-Symptomatik durch starken Blutdruckabfall; Kollapszustände, gelegentlich mit bradykarden Herzrhythmusstörungen und Synkopen. In Einzelfällen exfoliative Dermatitis. Eine Toleranzentwicklung sowie das Auftreten einer Kreuztoleranz gegenüber anderen Nitroverbindungen werden beschrieben. Zur Vermeidung einer Wirkverlustes hohe kontinuierliche Dosierungen vermeiden. Hinweis: Bedingt durch eine relative Umverteilung des Blutflusses in hypoventilierte Alveolargebiete kann eine vorübergehende Hypoxämie auftreten und bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit eine myokardiale Hypoxie ausgelöst werden. Die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr, zum Bedienen von Maschinen oder zum Arbeiten ohne sicheren Halt kann beeinträchtigt werden, insbesondere bei Behandlungsbeginn, Dosiserhöhung und Präparatwechsel sowie im Zusammenhang mit Alkohol. Weitere Informationen siehe Fach- und Gebrauchsinformation Stand: März 2001



**Herz-erfrischend!**

**isoket®**  
Wirkstoff: Isosorbiddinitrat



strittenen Chirurgie Patienten im Gegenheitspatienten durch eine ein Bein g Mit die ins Feuer g sion zeigt Ärzteschar Eine Gr unter eine berschätzu

Weil Ge zu