

**Originalarbeiten
Originals**

<p>141 Menninger, H.: Editorial</p> <p>142 Gaubitz, M.: Pharmakologische und immunologi- sche Grundlagen der Kombinations- therapie</p> <p>146 Menninger, H.: Kombinationstherapie der rheuma- toiden Arthritis: Update 2001</p> <p>159 Manger, B., B. Dechant, C. Antoni, J. R. Kalden: Kombinationstherapie des chimären monoklonalen Antitumornekrose- faktor-Antikörpers Infliximab mit Methotrexat bei Patienten mit rheumatoider Arthritis</p> <p>162 Horstmann, T., G. Jörger, H. C. Heitkamp, F. Mayer, E. Winter, H.-H. Dickhuth: Auswirkungen von Hüftsport auf Gangbild, Kraftverhalten und Lebens- qualität von Koxarthrotikern</p> <p>169 Gschwend, N.: Chirurgische Strategien in der Behandlung des kontrakten Ellbogens</p> <p>179 Mohr, W., C. Griesmann: Synoviale Osteochondromatose minore und majore Form</p> <p>184 Kongresskalender</p>	<p>Menninger, H.: Editorial</p> <p>Gaubitz, M.: Pharmacological and Immunological Fundamentals of Combination Therapy</p> <p>Menninger, H.: Combination Therapy for Rheumatoid Arthritis: Update 2001</p> <p>Manger, B. Dechant, C. Antoni, J. R. Kalden: Combination Therapy with the Chimeric Monoclonal Antitumour Necrosis Factor Infliximab (Remicade) plus Methotrexate in Rheumatoid Arthritis Patients</p> <p>Horstmann, T., G. Jörger, H. C. Heitkamp, F. Mayer, E. Winter, H.-H. Dickhuth: Effects of Sports Therapy on Gait Behaviour, Strength and Quality of Life of Patients Suffering from Osteoarthritis of the Hip</p> <p>Gschwend, N.: Management (Surgical Strategies) of Elbow Stiffness</p> <p>Mohr, W., C. Griesmann: Synovial Osteochondromatosis Minor and Major Type</p> <p>Congress Calendar</p>
--	--

**Pathologische Miniaturen
Pathological Notes**

Kongressbericht M33

Für Sie notiert M34

Abbildung der Titelseite:
Muster der Kombinationstherapie
(s. S. 143, Abb. 1, M. Gaubitz)

Avent

10 mg Filmt
100 mg Filmt
hydrat. Filmüber
hlung der aktiver
hier sorgfältig
erempfindlich
der Knochenma
it mittlerer bis s
über 0,02 mg/l
htung. Die erfo
leicht). Gastroi
ilische Phospha
kozyten < 2 G/l
emeinen unbed
fausfall, Ekzem
anaphylaktoide
ng der Infektan
ion, der -Gesam
empfohlene Er
Filmtabletten (N
ng stellen. Sta