

bringen
Spezialbetreuung für Alkohol-
kranke Kollegen. 14

**Tiefe Thrombose
ambulant kurieren**
Auch Hausärzte können den
Venennotfall versorgen. 17

Impressum 46

**Genickschuss als Pickel
verkannt!**
Waren die Kliniker mit Blindheit
geschlagen? 56

Politik und Perspektiven

**Neue Sparideen von
Ulla Schmidt**
Aber „aut idem“ muss keiner
rezeptieren. 33

**Was macht den Hausarzt
attraktiv?**
Maßnahmen gegen den
Nachwuchsmangel. 36

Praxisführung und Geld

**Allgemeinärzte rechnen
ehrlich ab**
Das beweisen geheime Testprüf-
läufe, die auf dem Hausärztetag
vorgestellt wurden. 49


**Nicht blind auf Überschuss
vertrauen!**
Welchen Erfolg hat die Praxis
wirklich? 50

Hosen runter bei der Bank?
Manche Banken wollen jetzt
schon die Basler Beschlüsse
umsetzen. 54

**Mit dem Passwort doc
finden Sie in
www.medical-tribune.de
spezielle Informationen
für Ärzte.**

bringen, etwa 90 %, gibt es
einige wenige mit bleibenden Schä-
den. Ich konnte bei solchen eine
Hirnstamm-Symptomatik objekti-

und Agnosie. Das sind klinisch
Nachweis entziehen, die aber



Tromphyllin[®]
retard 300/-600 **Neuer Name**

Die kleinsten, teilbaren und kostengünstigen Retardtabletten*

- Compliance fördernd
- Individuell dosierbar
- Budget entlastend

Tromphyllin[®] retard 300/600 Wirkstoff: Theophyllin 300 mg/600 mg Bronchospasmolytikum. **Zusammen-**
1 teilbare Tablette Tromphyllin[®] retard 300/600 enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Theophyllin-
600 mg. Weitere Bestandteile von Tromphyllin[®] retard 300/600: Hypromellose, Macrogol 6000, Magnesium-
Anwendungsgebiete: Behandlung und Vorbeugung von Atemnotzuständen aufgrund von Einengung der A-
(Bronchokonstriktion) bei Asthma bronchiale und chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen (z. B. ch
Bronchitis, Lungenemphysem). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile
Herzinfarkt, akute tachykarde Arrhythmien. Tromphyllin[®] retard 300/600 sollten nur bei strengster Indikatio
Vorsicht angewendet werden bei: Instabiler Angina pectoris, Neigung zu tachykarden Arrhythmien, schwerem
druck, hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie, Schilddrüsenüberfunktion, epileptischen Anfallsleiden, Ma
Zwölffingerdarmgeschwür, Porphyrie, Leber- und Nierenfunktionsstörungen. Kinder unter 12 bzw. 16 Jahren
Allgemeinen nicht mit Tromphyllin[®] retard 300/600 behandelt werden. Arzneimittel mit verzögerter Th
Freisetzung, wie Tromphyllin[®] retard 300/600 sind nicht zur Akutbehandlung des Status asthmaticus oder o
Bronchospastik bestimmt. Während der Schwangerschaft, besonders während der ersten drei Monate und wä
Stillperiode, sollten Tromphyllin[®] retard 300/600 nur nach Verordnung durch den Arzt und strenger Indikatio
verwendet werden. Aufgrund der diaplazentaren Übertragung und des Übergangs in die Muttermilch soll
geborene und gestillte Kinder von Müttern, die mit Tromphyllin[®] retard 300/600 behandelt werden, sorg
Tromphyllin[®] retard 300/600 -Wirkungen überwacht werden (therapeutische Serumkonzentrationen sind
Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Erregungszustände, Gliederzittern, Unruhe, Schlaflosigkeit, beschleun
unregelmäßiger Herzschlag, Palpitationen, Blutdruckabfall, Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen,
verstärkte Diurese, Veränderungen der Serumelektrolyte, insbesondere Hypokaliämie, Anstieg von Serum-Cal
-Kreatinin sowie Hyperglykämie und Hyperurikämie. Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber Theophyllin tr
selten auf. Verstärkung eines gastroösophagealen Reflux in der Nacht. Verstärkte Nebenwirkungen können t
dueller Überempfindlichkeit oder einer Überdosierung (Theophyllin-Konzentration im Plasma über 20 µg/ml).
Vor allem bei erhöhten Theophyllin-Plasmaspiegeln von mehr als 25 µg/ml können toxische Nebenwirkun
Krampfälle, plötzlicher Blutdruckabfall, ventrikuläre Arrhythmien und schwere Magen-Darm-Erscheinun
gastrointestinale Blutungen) auftreten. **Darreichungsform, Packungsgrößen und Preise:** Tromphyllin[®] re
OP mit 20 Retardtabletten N1 DM 10,64; OP mit 50 Retardtabletten N2 DM 24,96; OP mit 100 Retardtab
DM 42,66; Anstaltspackung, Tromphyllin[®] retard 600: OP mit 20 Retard
N1 DM 16,84; OP mit 50 Retardtabletten N2 DM 37,15; OP
Retardtabletten N3 DM 67,57; Anstaltspackung, Verschreibungs
Trommsdorff GmbH & Co. KG Arzneimittel · 52475 Alsdorf. Stand der in
Januar 2001

seit
1797  **Trommsdorff**
Arzneimittel

*bezogen auf 300 mg und 600 mg Tabletten

Hier ist Platz für Ihre Meinung ...

Redaktion Medical Tribune
Postfach 42 40
65032 Wiesbaden
Fax (06 11) 97 46-304

@ E-Mail: kontakt@
medical-tribune.de

