



Nierenzellkarzinom
(Artikel auf Seite 12)

Editorial

Intermittierende
Androgenblockade für wen? 3

Urologie international

Lokalisiertes Prostata-Ca
Geringere Blutungen bei
retropubischem Zugang 6

Beckenbodenübungen bei Harninkontinenz
Mehr Erfolg mit der Gruppentherapie? 6

Interstitielle Zystitis
Cimetidin sorgt für
effektive Symptomkontrolle 7

Übersicht

Die asymptomatische Mikrohämaturie
Mehr Aufmerksamkeit für Risikopatienten .. 8

Interview

Nierenzellkarzinom
Immuntherapie, Vakzination
und Stammzelltransplantation 12

Kongressbericht

Die biologische Uhr tickt auch für Männer
Erreicht die Anti-Aging-Bewegung
nun auch den Mann? 15

Prisma

Erektile Dysfunktion
Einfluss auf Gesundheit
und Selbstwertgefühl 16

Zentrale Erektionsverstärkung
Neuer Standard in der
oralen Therapie der ED 17

Blickpunkt Praxis

Der niedergelassene Urologe
(K)Ein Auslaufmodell? 18

Positives für die Urologen
Neufassung des Laborkapitels des EBM 18

Impressum 14

Kurz notiert 16

extracta
urologica
fragt

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei isolierter PIN III im Prostatapunktat, dass die nachfolgend erforderliche Prostatapunktion ein Malignom ergibt?

1. Unter 40 %
2. Zwischen 40 und 50 %
3. Mehr als 50 %

Antwort auf Seite 17