



Phylaxe
Stärken

em Risiko

orte

g enthält Dalteparin-Natrium 2.500 I.E.*
tionszwecke. Zusätzlich bei Fragmin® P:
bolischen Risiko, am OP-Tag auch bei
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit
(Thrombozytopenie Typ II) auf Heparin
iten Blutungsbereitschaft einhergehen.
om mit Blutungsneigung, Nieren- und
schzeitiger Behandlung mit den Serum-
geren, die mit gerinnungshemmenden
en mit zusätzlichen Risikofaktoren kön-
sowie der LDL und Lipase beobachtet,
lich tritt zu Beginn der Behandlung mit
onen kommen im allgemeinen nicht vor.
tlich unter 100.000/µl oder weniger als
nach Behandlungsbeginn. Bei Patienten
erbunden sein mit arteriellen und venö-
Teerstuhl. Dabei kann die gerinnungs-
sofort abgesetzt werden. Bei ihnen darf
e Thrombozyten muß deren Zahl, insbe-
he Reaktionen sind selten. Allergische
d Blutdruckabfall. Nebenwirkungen wie
s mit Hyperkaliämie und metabolischer
an der Injektionsstelle werden gelegent-
iedermolekulares Heparin. Nicht zu ver-
Fertigspritzen à 0,2 ml Injektionslösung
spritzen à 0,2 ml Injektionslösung (N3)
gspritzen à 0,2 ml Injektionslösung (N1)
à 0,2 ml
tangen **PHARMACIA**

Deutsche Gesellschaft für Angiologie

4/2001

Mitteilungen

Inhaltsverzeichnis

Editorial.....	4
Vorstand 2001	6
Beirat 2001	7
Ehrenmitglieder	9
Sektionen	10
Qualitätssteuerung in der Gefäßmedizin	11
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGEL-Leistungen) in der Angiologie und Phlebologie zur Diskussion gestellt.....	18
Einführung: Flugthrombose	23
WHO: Consultation on air travel and venous thromboembolism ..	26
Aerospace Medical Association: Traveler's thrombosis	28
Workshop Economy-Class Syndrome, Berlin, 8.6.2001	36
Stellenausschreibung	42
Beihilfen	43
Kongressankündigungen	44
Antrag auf Mitgliedschaft	47
Impressum	3. US

Beilagen:

Flyer Jahrestagung 2002 Darmstadt
Antwortpostkarte Adressenänderungen