



Von Kinderärzten wird ein gehöriges Maß an urologischem Know-how verlangt. In unserem Schwerpunkt können Sie sich auf den neuesten Stand bringen.

ab Seite **36**

Phimose-Therapie:

Zirkumzision, Triple Inzision oder Kortison?36

Harnweganomalie:

Wann Verlaufskontrolle reicht38

Harnsteine:

Tipps zu Ursachenforschung, Therapie und Metaphylaxe41

Genitaloperationen:

Wann ist der richtige Zeitpunkt?42

Enuresis:

Biofeedback-Training legt Kinder trocken45


Langes Gespräch begründen Sie mit ICD-Nummer F 9346

Kooperation Pädiater Urologe

Unmöglich: Phimose-Kind unter Prostata-Patienten?48

ÄP-Service


Fachbücher, Ratgeber und Infos aus dem Internet49



Täglich aktuelle Meldungen aus dem Fachbereich Pädiatrie finden Sie auf unserer Homepage im Internet www.aerztlichepraxis.de

Ihre Empfehlung für Patienten!

Vor dem Pflaster Octenisept®



schmerzfrei

farblos

aus der Apotheke

praktisch für

unterwegs



ÖKO-TEST 7/2000:

Von 23 getesteten Mitteln zur Wundbehandlung erhielten 11 die Bewertung „nicht empfehlenswert“, 5 „weniger empfehlenswert“, 6 „eingeschränkt empfehlenswert“ und nur 1 das Prädikat „empfehlenswert“: Octenisept®



Schülke & Mayr

Octenisept® Wund-Desinfektion ■ Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Octendindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol 2,0 g, (3-Cocostettsäureamidopropyl)-dimethylammonioacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser, Natriumhydroxid.
 ■ Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung ■ Gegenanzeigen: Octenisept® sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Für die Anwendung bei Kindern unter 8 Jahren liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor ■ Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Bei Spülungen in der Mundhöhle verursacht Octenisept® vorübergehend einen bitteren Geschmack ■ Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Octenisept® sollte nicht in größeren Mengen verschluckt werden oder in größeren Mengen, z. B. durch versehentliche Injektion, in den Blutkreislauf gelangen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
 Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Zum Kennenlernen einfach das 50-ml-Muster abfordern!

— Nur eine Anforderung pro Jahr möglich —

Schülke & Mayr GmbH • 22840 Norderstedt
 Telefon 040-521 00 666 • Telefax 040-521 00 253

www.schuelke-mayr.com
 e-mail: mail@schuelke-mayr.com

Praxisstempel

C O U P O N

ÄPP-C-12/01

Unterschrift

Foto: KES/Dr. Reinbacher; Transglobe; Montage: ÄP; Privat