

Der PRAXIS-Fall

- 2022 A. Krautheim
Pruritische und urtikarielle Papeln und Plaques in der Schwangerschaft

PRAXIS-Journal Club

- 2025 M. Koller
Das Risiko von Hypertonikern, innerhalb von fünf Jahren an einem kardiovas-
kulären Ereignis zu versterben, kann mit einem einfachen Score kalkuliert werden
- 2026 J. Fischer
Re-Analyse der Framingham-Daten: Der Grenzwert für erhöhtes Risiko durch
systolische Hypertonie ist alters- und geschlechtsabhängig

Rubriken

- 2021 Impressum
- 2028 Zeitschriftenreferat
- 2040 Vorschau

Magazin

- 2029 **Aktuelles:** Notizen: H. Feldmeier: Pesterreger als Biowaffe möglich, aber unwahrscheinlich
- 2031 **Neue Medien:** Praxis-Netwatch
- 2033 **Kulturelles:** Mediziner Literatürätsel, Schauspiel, Musiktheater, Kleinkunst, Nocturne,
Ausstellungen

Zusammensetzung: Budesonidum und Formoterol; fumaras dihydricus; Hilfsstoff: Lactosum monohydricum; Turbuhaler zu 100/6µg und 200/6µg je 60 und 120 Inhalationen; Liste B. **Indikation:** Asthma bronchiale. **Dosierung:** Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 100/6µg; 2x tägl. 1-2 Inhal. oder 200/6µg; 2x tägl. 1-2 Inhal.