

Zeitschrift des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte e.V.

Herausgeber: Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. in Zusammenarbeit mit weiteren pädiatrischen Verbänden.
Redakteure: Prof. Dr. Hermann Olbing, Essen, Dr. Christoph Kupferschmid, Ulm, Claus-Dieter West, Ratingen
ISSN 0340-5877

INHALT

Forum

- Arzt und Erziehung
Lisbeth Dittmer 99
- Mehr Sprachtherapie, weniger, oder eine andere? – Was ist für wen normal?
Christoph Kupferschmid 106
- Interviews:
– Sprachheiltherapie
Agnes Hildmann 108
– Sprachtherapie
Cornelia Tigges-Zuzok.. 110
- Jo Kanders*
- „Das Geschäft mit der Angst“
Christoph Kupferschmid 113

Die Eradikation der Poliomyelitis – Eine gesundheitspolitische Verpflichtung
Adolf Windorfer, Fabian Feil 114

Thema Impfschutz im Biologie-Unterricht
Martin Wiehl, Burkhard Schneeweiß 115

„Jedem das Seine“
– Leserbrief
Rainer Thiem 118
– Bedauern
Klaus Gritz 118

Aktuell

Berichte und Meldungen 119

Fortbildung

Genetik und genetische Beratung bei Epilepsien im Kindesalter
Bernd A. Neubauer 128

Allergieprävention – ein update
Joachim Kühr 136

Consilium Infectiorum: Prolongierter Neugeborenen-Ikterus
Reinhard Roos 142

Auslandsreisen und Ferien mit Kindern – Kinderärztliche und tropenmedizinische Aspekte
Ekkehard Döhring et al. 144

Welche Diagnose wird gestellt?
Anno Diemer 153

Magazin

Praxis Live – Cartoon 155

Fortbildungstermine des BVKJ 156

Die Paediatrice – Termine 158

Tagungen 160, 186

Masernerkrankungen

Erreger: Masernviren

Übertragung
Tröpfcheninfektion durch: Niesen, Husten, Sprechen, Handschütteln
Schmierinfektion zum Beispiel über: verkeimte Gegenstände

Ansteckung (Inkubationszeit 10 - 14 Tage) **Ausbruch der Krankheit**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- > Schnupfen
- > Husten
- > Bindehautentzündung
- > Kopfschmerzen
- > Übelkeit
- > Fieber
- > Rötung der Mundschleimhaut
- > Zweiter Fieberanstieg

Inkubationszeit: Bereich zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit. Die Gefahr, sich an einem Erkrankten anzustecken beginnt bereits ca. 2-4 Tage vor Ausbruch der Krankheit und endet etwa mit dem Abklingen des Hautausschlags

Fleckiger, roter Hautausschlag, der sich allmählich (innerhalb von drei Tagen) über den ganzen Körper ausbreitet und unter leichter Abschuppung nach weiteren 3 bis 4 Tagen abklingt.

Arbeitsfolie für den Biologieunterricht