

SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten/ junior® 5 mg Kautabletten/ - mini 4 mg Kautabletten
Wirkstoff: Montelukast-Natrium. **Zusammensetzung:**
zeitlich wirksame Bestandteile: 1 SINGULAIR® mini 4 mg Kautablette enthält 4,2 mg Montelukast-Natrium, entsprechend 4,0 mg Montelukast; 1 SINGULAIR junior® 5 mg Kautablette enthält Montelukast-Natrium 5,2 mg, entsprechend 5,0 mg Montelukast; 1 SINGULAIR® 10 mg Filmtablette enthält Montelukast-Natrium 10,4 mg, entsprechend 10 mg Montelukast. **Sonstige Bestandteile:** SINGULAIR® mini 4 mg Kautabletten: D-Mannitol; Mikrokristalline Cellulose; Hypromellose; Eisen(III)-oxid (Farbstoff E 172); Croscarmellose-Natrium; Permaseal, künstlich, 181612 vaudan-Roure, Aspartam und Magnesium (stearat, palmitat, oleat). SINGULAIR junior® 5 mg Kautabletten: D-Mannitol, Mikrokristalline Cellulose, Hypromellose, Eisen(III)-oxid (Farbstoff E 172), Croscarmellose-Natrium, Permaseal, künstliches Kirsch-Aroma 181612, Aspartam, Magnesiumstearat. SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten: Mikrokristalline Cellulose, Lactose Monohydrat (89,3 mg), Croscarmellose-Natrium, Hypromellose, Magnesium (stearat, palmitat, oleat). Filmüberzug: Hypromellose, Hypromellose, Titaniumdioxid (Farbstoff E 171), Eisen (III)-oxid (Farbstoff E 172), Glycerin, Sesquioxidhydrat (Farbstoff E 172), Carnaubawachs. **Anwendungsgebiete:** Als Zusatzbehandlung bei Patienten mit leichtem bis mittelgradigem chronischem Asthma, das mit einem inhalativen Kortikoid nicht ausreichend behandelt und das durch die bedarfsweise Anwendung von kurzwirksamen β_2 -Sympathomimetika nicht ausreichend unter Kontrolle gebracht werden kann. Zur Prophylaxe der belastungsinduzierten Bronchokonstriktion (Belastungsasthma). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile dieser Arzneimittel. **Warnhinweis:** Die 4-mg-Kautabletten und die 5-mg-Kautabletten enthalten Aspartam. **Nebenwirkungen:** SINGULAIR® mini 4 mg Kautabletten: Durst wurde häufig als Nebenwirkung bei mit Montelukast behandelten Patienten angegeben. Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Montelukast nicht gesichert werden konnte, wurden folgende unerwünschte Arzneimittelwirkungen angegeben, die bei mehr als 3% der pädiatrischen Patienten von 2-5 Jahren und häufiger als unter Placebo auftrat: Husten. SINGULAIR junior® 5 mg Kautabletten: Die häufigste Nebenwirkung, die in Verbindung mit der Einnahme von SINGULAIR junior® 5 mg Kautabletten stehen könnte, war Kopfschmerz. Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Montelukast nicht gesichert werden konnte, wurden folgende unerwünschte Arzneimittelwirkungen angegeben, die bei mehr als 3% der pädiatrischen Patienten von 6-14 Jahren und häufiger als unter Placebo auftraten: Pharyngitis, Grippe, Fieber, Sinusitis, Übelkeit, Diarrhoe. SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten: Die häufigsten Nebenwirkungen, die in Verbindung mit der Einnahme von SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten stehen könnten, waren abdominale Beschwerden und Kopfschmerzen. Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Montelukast nicht gesichert werden konnte, wurden folgende unerwünschte Arzneimittelwirkungen angegeben, die bei mehr als 1% der Patienten und gleich häufiger als unter Placebo auftraten: Kopfschmerzen, abdominale Beschwerden, Schwäche/Erschöpfung, Fieber, Schwindel, Diarrhoe, Dyspepsie, infektiöse Gastroenteritis, Zahnschmerzen, Schwindel, Insomnie, verstopfte Nase, Husten, Influenza, Exanthem. Unter der Therapie mit Montelukast wurde nach Markteinführung folgendes berichtet: Schwäche/Erschöpfung, Unwohlsein, Ödeme, Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Anaphylaxie, Angioödem, Urtikaria, Juckreiz, Exanthem und - ein Einzelfall mit eosinophiler Leberinfiltraten); Schwindel, verändertes Raumgefühl einschließlich Alpträume, Benommenheit, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Ruhelosigkeit, Krampfanfälle; Gelenks- und Muskelschmerzen einschließlich Muskelkrämpfe; Diarrhoe, Mundtrockenheit, Dyspepsie, Übelkeit, Erbrechen; erhöhte Blutungsneigung, Bluterguss. **Hinweis für Verkehrsteilnehmer:** Es ist nicht zu erwarten, dass SINGULAIR® die Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen eines Patienten beeinträchtigt. Allerdings wurde es sehr selten von einzelnen Patienten über Benommenheit berichtet. **Dosierung:** Kinder von 2-5 Jahren: 1 Kautablette SINGULAIR® mini 4 mg tgl. vor dem Schlafengehen. Kinder von 6-14 Jahren: 1 Kautablette SINGULAIR junior® 5 mg tgl. vor dem Schlafengehen. Erwachsene: 1 Filmtablette SINGULAIR® 10 mg tgl. vor dem Schlafengehen. Die Anwendung von Montelukast bei Kindern unter 2 Jahren wird nicht empfohlen, bis weitere Daten vorliegen, da die Erfahrungen begrenzt sind. **Verschreibungspflichtig.**

Stand: 11/2001

Weitere Informationen enthalten die Fach- und die Gebrauchsinformationen, deren aufmerksame Durchsicht wir empfehlen.


DIECKMANN ARZNEIMITTEL GMBH
 Postfach 1202, 85530 Haar

Vertrieb:
 MSD SHARP & DOHME GMBH, 85530 Haar
 MSD CHIBROPHARM GMBH, 85530 Haar
 CHIBRET PHARMAZEUTISCHE GMBH, 85530 Haar
 PARIPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, 85530 Haar

meine **YAHOO!** Für Ärzte

www.meinearztseite.de/Hotline:0800/6730673

MSD Infocenter
 Tel.: 0800/673 673 673
 Fax: 0800/673 673 329
 e-mail: infocenter@msd.de



Larva migrans cutanea (s. Beitrag von Ekkehard Döhring et al. auf S. 144 ff.)

Berufsfragen

Der Honorarausschuss informiert
Wolfram Hartmann161

Kann der Arzt heute noch nach eigenem Ermessen impfen?
Michael Zinke165

Jahresberichte 2000/2001 der Landesverbände

- Bremen
Bernward Fröhlingsdorf ..169
- Hessen
Josef Geisz170
- Westfalen-Lippe
Irmgard Gockel.....171
- Baden
Andreas Scheffzek.....172
- Bayern
Waltraud Knipping.....175
- Hamburg
Michael Zinke176

- Brandenburg
Jens-Uwe Köhler181

- Schleswig-Holstein
Michael Kinet183

- Niedersachsen
Tilman Kaethner184

- Saarland
Wolfgang Wahlen185

Personalia165, 187

Frau Dr. med. Elisabeth Birke zum 75. Geburtstag
Eberhard Lassen188

Professor Dr. sc. med. Anno Dittmer zum 75. Geburtstag
Joachim Oppermann189

Wichtige Telefon- und Telefax-Nummern/
 Impressum.....192

Pharma-Info190

Praxistafel.....182

Zum Titelbild:

Die Unverzichtbarkeit des Impfschutzes muss auch Thema im Biologieunterricht sein und frühzeitig beginnen. Nur sachkundiges Wissen der Kinder und Jugendlichen ist das beste Fundament für eine gesundheitsbewusste Einstellung. Siehe hierzu den Beitrag auf S. 115-116.

Beilagenhinweis:

Dieser Ausgabe liegt das Jahresinhaltsverzeichnis 32. Jg. (2001) bei.

Wir bitten um freundliche Beachtung.