

## RöFo

- 187 Bestimmung der myokardialen Perfusionsreserve bei KHK-Patienten mit der kontrastmittelverstärkten MRT: Ein Vergleich zwischen semiquantitativer und quantitativer Auswertung  
*M. Schmitt, O. K. Mohrs, S. E. Petersen, K.-F. Kreitner, T. Voigtländer, T. Wittlinger, G. Horstick, S. Ziegler, J. Meyer, M. Thelen, W. G. Schreiber*
- 196 Vergleich von schneller MR-Flussmessung in Atemanhaltetechnik in Aorta ascendens und Truncus pulmonalis mit rechts- und linksventrikulärer Cine MR-Bildgebung zur Schlagvolumenbestimmung bei Probanden  
*M. B. Rominger, H.-P. Dinkel, G. F. Bachmann*
- Interventionelle Radiologie**
- 202 Einfache Lokalisation von intrapulmonalen Rundherden – CT-gesteuerte perkutane Hakenmarkierung  
*F. P. Poretti, E. Brunner, D. Vorwerk*
- 208 Analgesiedierung in der interventionellen Radiologie  
*U. Linsenmaier, P. Wagner, K. J. Pfeifer, M. Reiser*
- 216 Perkutane Radiofrequenzablation maligner Leberläsionen: Erste Erfahrungen mit einem 200-W-Generator  
*A. H. Mahnken, J. Tacke, A. Bücken, R. W. Günther*
- 224 Der Stellenwert der Magnetresonanztomographie (MRT) für die Verlaufskontrolle bei Patienten mit transjugulärem intrahepatischem portosystemischem Stent-Shunt (TIPSS)  
*P. M. Schlegel, B. Tombach, P. Reimer, T. Vestring, J. Menzel, H. E. Möller, W. Heindel*
- Technische Mitteilungen**
- 231 Erste Erfahrungen mit einem 6F kompatiblen selbstexpandierenden Nitinol-Stent  
*T. Zeller, U. Frank, C. Müller, K. H. Bürgelin, L. Sinn, B. Horn, H. Rosenkamm*
- Der interessante Fall**
- 236 Atypische Mykobakteriose der Mamma: MR-Diagnostik
- 238 Traumatischer Verschluss der Arteria iliaca nach einer Karussellfahrt
- 239 CT-Diagnose eines asymptomatischen Cor triatriatum sinistrum
- 241 Leserbrief
- 242 Errata
- 195, 223 Buchbesprechungen
- 187 Evaluation of myocardial perfusion reserve in patients with CAD using Contrast-Enhanced MRI: A comparison between semiquantitative and quantitative methods  
*M. Schmitt, O. K. Mohrs, S. E. Petersen, K.-F. Kreitner, T. Voigtländer, T. Wittlinger, G. Horstick, S. Ziegler, J. Meyer, M. Thelen, W. G. Schreiber*
- 196 Comparison between fast MR flow quantification in breathhold technique in ascending aorta and pulmonary trunc with right and left ventricular cine-MRI for the assessment of stroke volumes in healthy volunteers  
*M. B. Rominger, H.-P. Dinkel, G. F. Bachmann*
- Interventionelle radiology**
- 202 Simple localization of peripheral pulmonary nodules – CT-guided percutaneous hook-wire localization  
*F. P. Poretti, E. Brunner, D. Vorwerk*
- 208 Sedoanalgesia in interventional radiology  
*U. Linsenmaier, P. Wagner, K. J. Pfeifer, M. Reiser*
- 216 Percutaneous radiofrequency ablation of liver malignancies: First experience with a 200-W radiofrequency generator  
*A. H. Mahnken, J. Tacke, A. Bücken, R. W. Günther*
- 224 The value of magnetic resonance imaging (MRI) for the follow-up of patients with transjugular intrahepatic portosystemic shunts (TIPS)  
*P. M. Schlegel, B. Tombach, P. Reimer, T. Vestring, J. Menzel, H. E. Möller, W. Heindel*
- Technical information**
- 231 Experiences with a 6F-Sheath Compatible Self-Expanding Nitinol Stent  
*T. Zeller, U. Frank, C. Müller, K. H. Bürgelin, L. Sinn, B. Horn, H. Rosenkamm*