

Aus dem Inhalt

Medizin

Wer darf ins Thermalbad?

Kompetenter Rat für Venen-, Herz- und Lungenkranke. 6

Uterus-Myom in der Augenhöhle

Therapie brauchte kein Skalpell. 7

Resistenzen haben ausgespielt

Pneumonie & Co. sicher niederringen. 10

Geisterfahrer

Liebe Patienten lassen auch Tote ans Steuer. 12

Erkältung natürlich lindern

Mit Efeukraft und Sonnenhut an Nase und Rachen. 14

Fett soll Pfunde schmelzen

Was ist dran an der Wunderwaffe? 24

Schöne Narben und glatte Wangen

Für den Patienten zählt auch die Ästhetik. 26

Impressum 32

Politik und Perspektiven

Hausärzte-Streik für mehr Honorar

Franzosen machen's vor. 20

Schuldige aufs Plakat

Im Wartezimmer zieht Protest. 21

Düsseldorf oder Kalkutta?

Mit offener Tbc mo Lebensmittel verka

In Sachen Medizin ist Deutschland manchmal ein Entwicklungsland, kritisiert der Düsseldorfer, Allgemeinarzt Dr. Noori Jehif.

An MEDICAL TRIBUNE

Der Leiter eines großen bekannten Lebensmittelmarktes arbeitete monatelang mit einer offenen hochansteckenden Lungentuberkulose bis er während der Arbeit zusammenbrach. Der ca. 1,65 m große, schmale Mann mit ständig glü-

hender Zigarette in Hand begrüßte die Kunden laut und freundlich und hustete sehr oft dabei. Er half gern mit, Obst, Gemüse und andere Lebensmittel zu sortieren.

„Sie sehen nicht gut aus und Sie husten ständig“, sagte ich ihm einmal, als ich mit meiner Frau in seinem Geschäft einkaufen war. „Sie sollten sich bald die Lunge röntgen lassen“, gab ich ihm den Rat. Diese verdammte Bronchitis würde er nicht los, sagte er, trotz



Tromphyllin®
retard 300/-600

Die kleinsten, teilbaren und kostengünstigen Retardtabletten*

- Compliance fördernd
- Individuell dosierbar
- Budget entlastend

Tromphyllin® retard 300/600 Wirkstoff: Theophyllin 300 mg/600 mg- Bronchospasmolytikum. **Zusammensetzung:** Teilbare Tablette Tromphyllin® retard 300/600 enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Theophyllin 300 mg/600 mg. Weitere Bestandteile von Tromphyllin® retard 300/600: Hypromellose, Macrogol 6000, Magnesiumstearat. **Anwendungsgebiete:** Behandlung und Vorbeugung von Atemnotzuständen aufgrund von Einengung der Atemwege (Bronchokonstriktion) bei Asthma bronchiale und chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen (z. B. chronischer Bronchitis, Lungemphysem). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile, frischer Herzinfarkt, akute tachykarde Arrhythmien. Tromphyllin® retard 300/600 sollten nur bei strengster Indikation und mit Vorsicht angewendet werden bei: Instabiler Angina pectoris, Neigung zu tachykarden Arrhythmien, schwerem Bluthochdruck, hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie, Schilddrüsenüberfunktion, epileptischen Anfallsleiden, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Porphyrie, Leber- und Nierenfunktionsstörungen. Kinder unter 12 bzw. 16 Jahren sollen im Allgemeinen nicht mit Tromphyllin® retard 300/600 behandelt werden. Arzneimittel mit verzögerter Theophyllin-Freisetzung, wie Tromphyllin retard

Hustentropfen bei dem stand des M Zigarettenentzugentumor. Mann lang laden nicht ca. zweiein in einem ar erzählte m seine dran schichte.

Seine bei gelöchert, s gen: „Wort Angaben w

Endli
Was
heit

Im letz
der Insel
Fischgesch
„Dorsch, A
scherzhaft
jetzt auch