

Aus dem Inhalt

Medizin

Mit Antibiotika ins Schwarze treffen

Das senkt die Kosten bei Pharyngitis & Co. 4

Schnelle Rettung fürs Ischämie-Bein

Bei Ulkus, Ruheschmerz oder Gangrän heißt es sofort handeln! 6

Ausgezogene Erreger

Was die lieben Patienten so alles haben 10

Fellatio schützt den Fötus

Was saftiger Sex vermag. 15

Bronchien am Umbau hindern!

Was Sie bei leichtem Dauerasthma tun müssen. 23

Wer knackt die Diabetes-Nuss?

Vier typische Fälle wollen behandelt sein. 26

Ich lasse meine Patienten sterben!

Wann Dr. Drews lieber untätig ist. 28

Politik und Perspektiven

Mehr Honorar und kein Regress

Aber nur für Arzneimittelsparer! 18

DOOFI-Studie will Kollegen entlarven

Wie Dr. Kühne seinen frustrierenden Richtlinienkampf

KBV will Missbrauch von Lesegeräten Von allen guten Ge- verlassen?

Zum Beitrag „KBV will Missbrauch mit mobilen Lesegeräten eindämmen – Teures und unsinniges Projekt“, MT 8/02, S. 33

An MEDICAL TRIBUNE
Nach intensiven Recherchen, die ein Missbrauchspotenzial bei der Benutzung von Messern haben erkennen lassen, hat die Regierung ein Gesetz vorgelegt, das die Benutzung von Messern regelt:
1. Ein Messer darf nur nach einer

Zertifizierung, die ihm ordnungsgemäßes Funktionieren attestiert, verkauft werden. Altmesser sind nachzuzertifizieren.
2. Sofort nach jeder ordnungsgemäßen Benutzung muss das Messer durch ein vom Benutzer zu erstehendes zertifiziertes Gerät stumpf gemacht werden.
3. Ein erneutes Schärfen vor einer ordnungsgemäßen Benutzung ist mit Datum, Uhrzeit und Unterschrift zu protokollieren. Diese Pro-



Tromphyllin[®]
retard 300/-600

Die kleinsten, teilbaren und kostengünstigen Retardtabletten*

- Compliance fördernd
- Individuell dosierbar
- Budget entlastend

Tromphyllin[®] retard 300/-600 Wirkstoff: Theophyllin 300 mg/-600 mg- Bronchospasmolytikum. **Zusammensetzung:** 1 teilbare Tablette Tromphyllin[®] retard 300/-600 enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Theophyllin 300 mg/-600 mg. Weitere Bestandteile von Tromphyllin[®] retard 300/-600: Hypromellose, Macrogol 6000, Magnesiumstearat. **Anwendungsgebiete:** Behandlung und Vorbeugung von Atemnotzuständen aufgrund von Einengung der Atemwege (Bronchokonstriktion) bei Asthma bronchiale und chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen (z. B. chronischer Bronchitis, Lungemphysem). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile, frischer Herzinfarkt, akute tachykardie Arrhythmien. Tromphyllin[®] retard 300/-600 sollten nur bei strengster Indikation und mit Vorsicht angewendet werden bei: Instabiler Angina pectoris, Neigung zu tachykarden Arrhythmien, schwerem Bluthochdruck, hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie, Schilddrüsenüberfunktion, epileptischen Anfallsleiden, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Porphyrie, Leber- und Nierenfunktionsstörungen. Kinder unter 12 bzw. 16 Jahren sollen im Allgemeinen nicht mit Tromphyllin[®] retard 300/-600 behandelt werden. Arzneimittel mit verzögerter Theophyllin-Freisetzung, wie Tromphyllin retard 300/-600, sind nicht zur Akutbehandlung des Status asthmaticus oder der akuten Bronchospastik bestimmt. Während der

tokolle sind
ren.
4. Jeder M
Ende jeder
schrift zu e
ser nur zu
cken verwe
schriften si
rium zu sch
5. Unsere
darauf, da
Gesetz jeg
Missbrauch
ersticken w

Kamp
Ich
Sch

Zum Beitr
Wartezim
giert aller

An ME
Selbstve
sere Warte
xen politis
Geschmack
Wer jedoc
tungen ab