

SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten/ - junior® 5 mg Kautabletten/ - mini 4 mg Kautabletten
Wirkstoff: Montelukast-Natrium. **Zusammensetzung:** Arzneilich wirksame Bestandteile: 1 SINGULAIR® mini 4 mg Kautablette enthält 4,2 mg Montelukast-Natrium, entsprechend 4,0 mg Montelukast; 1 SINGULAIR junior® 5 mg Kautablette enthält Montelukast-Natrium 5,2 mg, entsprechend 5,0 mg Montelukast; 1 SINGULAIR® 10 mg Filmtablette enthält Montelukast-Natrium 10,4 mg, entsprechend 10 mg Montelukast.
Sonstige Bestandteile: SINGULAIR® mini 4 mg Kautabletten: D-Mannitol; Mikrokristalline Cellulose; Hyprolose; Eisen(III)-oxid (Farbstoff E 172); Croscarmellose-Natrium; Kirsch-Aroma; Permaseal, künstlich, 181612 Givaudan-Roure, Aspartam und Magnesium (stearat, palmitat, oleat). SINGULAIR junior® 5 mg Kautabletten: D-Mannitol, Mikrokristalline Cellulose, Hyprolose, Eisen(III)-oxid (Farbstoff E 172), Croscarmellose-Natrium, Permaseal, synthetisches Kirsch-Aroma 181612, Aspartam, Magnesiumstearat. SINGULAIR® 10 mg Filmtablette: Mikrokristalline Cellulose, Lactose Monohydrat (89,3 mg), Croscarmellose-Natrium, Hyprolose, Magnesium (stearat, palmitat, oleat). Filmüberzug: Hypromellose, Hyprolose, Titan-dioxid (Farbstoff E 171), Eisen (III)-oxid (Farbstoff E 172), Eisenoxidhydrat (Farbstoff E 172), Carnaubawachs. **Anwendungsgebiete:** Als Zusatzbehandlung bei Patienten mit leichtem bis mittelgradigem chronischem Asthma, das mit einem inhalativen Kortikoid nicht ausreichend behandelt und das durch die bedarfsweise Anwendung von kurzwirksamen β -Sympathomimetika nicht ausreichend unter Kontrolle gebracht werden kann. Zur Prophylaxe der belastungsinduzierten Broncho-konstriktion (Belastungsasthma). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile dieser Arzneimittel. **Warnhinweis:** Die 4-mg-Kautabletten und die 5-mg-Kautabletten enthalten Aspartam. **Nebenwirkungen:** SINGULAIR® mini 4 mg Kautabletten: Durst wurde häufig als Nebenwirkung bei mit Montelukast behandelten Patienten angegeben. Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Montelukast nicht gesichert werden konnte, wurde folgende unerwünschte Arzneimittelwirkung angegeben, die bei mehr als 3 % der pädiatrischen Patienten von 2 – 5 Jahren und häufiger als unter Placebo auftrat: Husten. SINGULAIR junior® 5 mg Kautabletten: Die häufigste Nebenwirkung, die in Verbindung mit der Einnahme von SINGULAIR junior® 5 mg Kautabletten stehen könnte, war Kopfschmerz. Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Montelukast nicht gesichert werden konnte, wurden folgende unerwünschte Arzneimittelwirkungen angegeben, die bei mehr als 3 % der pädiatrischen Patienten von 6 – 14 Jahren und häufiger als unter Placebo auftraten: Pharyngitis, Influenza, Fieber, Sinusitis, Übelkeit, Diarrhoe. SINGULAIR® 10 mg Filmtablette: Die häufigsten Nebenwirkungen, die in Verbindung mit der Einnahme von SINGULAIR® 10 mg Filmtablette stehen könnten, waren abdominelle Beschwerden und Kopfschmerzen. Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Montelukast nicht gesichert werden konnte, wurden folgende unerwünschte Arzneimittelwirkungen angegeben, die bei mehr als 1 % der Patienten und gleich häufig oder häufiger als unter Placebo auftraten: Kopfschmerzen, abdominelle Beschwerden, Schwäche/Erschöpfung, Fieber, Trauma, Diarrhoe, Dyspepsie, infektiöse Gastroenteritis, Zahnschmerzen, Schwindel, Insomnie, verstopfte Nase, Husten, Influenza, Exantheme. Unter der Therapie mit Montelukast wurde nach Markteinführung folgendes berichtet: Schwäche/Erschöpfung, Unwohlsein, Ödeme, Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Anaphylaxie, Angioödem, Urtikaria, Juckreiz, Exanthem und – ein Einzelfall mit eosinophilen Leberinfiltraten); Schwindel, verändertes Träumen einschließlich Alpträume, Benommenheit, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Ruhelosigkeit, Krampfanfälle; Arthralgie, Myalgie einschließlich Muskelkrämpfe; Diarrhoe, Mund-trockenheit, Dyspepsie, Übelkeit, Erbrechen, erhöhte Blutungsneigung, Bluterguss. **Hinweis für Verkehrsteilnehmer:** Es ist nicht zu erwarten, dass SINGULAIR® die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen eines Patienten beeinträchtigt. Allerdings wurde sehr selten von einzelnen Patienten über Benommenheit berichtet. **Dosierung:** Kinder von 2 – 5 Jahren: 1 Kautablette SINGULAIR® mini 4 mg tgl. vor dem Schlafengehen. Kinder von 6 – 14 Jahren: 1 Kautablette SINGULAIR junior® 5 mg tgl. vor dem Schlafengehen. Erwachsene: 1 Filmtablette SINGULAIR® 10 mg tgl. vor dem Schlafengehen. Die Anwendung von Montelukast bei Kindern unter 2 Jahren wird nicht empfohlen, bis weitere Daten vorliegen, da die Erfahrungen begrenzt sind. **Verschreibungspflichtig.**

Stand: 11/2001

Weitere Informationen enthalten die Fach- und die Gebrauchsinformationen, deren aufmerksamste Durchsicht wir empfehlen.

DIECKMANN ARZNEIMITTEL GMBH
 Postfach 1202, 85530 Haar

Mitvertrieb:
 MSD SHARP & DOHME GMBH, 85530 Haar
 MSD CHIBROPHARM GMBH, 85530 Haar
 CHIBRET PHARMAZEUTISCHE GMBH, 85530 Haar
 VARIPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, 85530 Haar

meine **YAHOO!** Für Ärzte

www.meinearztseite.de/Hotline:0800/6730673

MSD Tel.: 0800/673 673 673
Infocenter Fax: 0800/673 673 329
 e-mail: infocenter@msd.de

Welche Diagnose wird gestellt?
Frank Riedel239

Schizophrenie im Kindes- und Jugendalter – Möglichkeiten zur Früherkennung und Risikobeschränkung
Christian Eggers242

Zwei Teenager mit langjährigen, rezidivierenden Bauchschmerzen und Durchfällen
Gerd-Michael Lackmann249




Abb. A: Normale Dünndarmschleimhautzotten

Consilium Infectiorum: Zwei Fragen zu Neurodermitis
Ulrich Wahn254

Magazin

Wenn ich damals ein Fieberthermometer gehabt hätte... – Brief des Samuel Hahnemann an die Jünger des Asklepius im 21. Jahrhundert
Jürgen Schwarz256

Fortbildungstermine des BVKJ.....259

Programm der 32. Jahrestagung 2002 des BVKJ in Würzburg 261

Tagungen.....266



Bücher269

Praxis Live – Cartoon270

Berufsfragen

Der Honorar Ausschuss informiert
Wolfram Hartmann271

Korrektur der Diagnosenverschlüsselung nach ICD-10-SGBV
Michael Zinke275

Personalia276

Herrn Professor Dr. Gerhard Ruhrmann zum 75. Geburtstag
Klaus Gritz278

Wichtige Telefon- und Telefax-Nummern/ Impressum.....284

Pharma-Info279

Praxistafel.....279

Beilagenhinweis:

Dieser Ausgabe liegt eine Teilbeilage für Abonnementwerbung für die Zeitschrift „Handbuch für den Vorgesetzten“, Bonn (Postvertriebskennzeichen: G 13944), bei.

Wir bitten um freundliche Beachtung.

Zum Titelbild:

Gerade einmal DM 24,95 kostete dieser Fahrradhelm, der dem kleinen Matthias das Leben rettete (Foto: Bild-Zeitung vom 14.6.2001).

Lesen Sie hierzu die Beiträge von Jörg-Dieter Schneider und Ellen Haase auf den Seiten 208 und 211 ff.