

Co-Amoxi-Mepha

Amoxicillin / Clavulansäure



Gute Karten in Sachen Antibiotika-Therapie

NEU

Mit der Einführung der **1 Gramm-Form** bieten wir Ihren Patienten noch mehr Vorteile:

- Einnahme nur noch 2 x täglich!
- 30% günstiger als das Original!

kassenzulässig

mepha

Okay mit Mepha-Generika

Kurzcharakteristik Co-Amoxi-Mepha*

Co-Amoxi-Mepha® 375 / 625 / 1000: Lactab®, Co-Amoxi-Mepha® 156,25 / 312,5: Pulver zur Zubereitung von 100 ml Suspension. Antibiotikum (Aminopenicillin kombiniert mit Clavulansäure) **Z:** 1 Lactab® zu 375 mg enthält: Amoxicillinum anhydricum 250 mg, Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 125 mg, 1 Lactab® zu 625 mg enthält: Amoxicillinum anhydricum 500 mg, Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 125 mg, 1 Lactab® zu 1000 mg enthält: Amoxicillinum anhydricum 875 mg, Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 125 mg, 5 ml Suspension 156,25 enthalten: Amoxicillinum anhydricum 125 mg, Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 31,25 mg; Hilfsstoffe: Aromatica, Saccharinum natricum, Natrii benzoas (E 211), 5 ml Suspension 312,5 enthalten: Amoxicillinum anhydricum 250 mg, Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 62,5 mg; Hilfsstoffe: Aromatica, Saccharinum natricum, Natrii benzoas (E 211). **I:** Infektionen mit grampositiven und gramnegativen Erregern (inkl. Keime, die aufgrund von β -Lactamase-Bildung gegen Amoxicillin resistent sind), Tonsillitis, Pharyngitis, Laryngitis, Otitis media, Sinusitis, Akute Bronchitis mit bakterieller Superinfektion und Exazerbation der chronischen Bronchitis, bakterielle Pneumonie, Pyelonephritis, Zystitis, Urethritis, Typhus abdominalis, Paratyphus, Shigellose, Gonorrhoe, Haut- und Weichteilinfektionen, Salpingitis, Adnexitis, Endometritis, bakterielle Vaginitis. Wirkungsspektrum von Amoxicillin/Clavulansäure: vgl. Arzneimittel-Kompendium. **D:** Abhängig von Alter, Körpergewicht und Nierenfunktion des Patienten sowie vom Schweregrad der Infektion. **Übliche Dosierung:** Erwachsene: leichte und mittelschwere Infektionen: 3 x täglich 375 mg, in speziellen Fällen 2 x täglich 1000 mg oder 3 x täglich 625 mg, Kinder: Unter 2 Jahren: 25–50 mg/kg KG täglich, in 3 Dosen. Über 2 Jahre: 25–37,5 mg/kg KG täglich, in 3 Dosen (leichte bis mittelschwere Infektionen), 50–75 mg/kg KG täglich, in 3 Dosen (schwere Infektionen). **Spezielle Dosierungsanweisungen:** bei Niereninsuffizienz, Hämodialyse, Patienten unter 40 kg KG, älteren Patienten: vgl. Arzneimittel-Kompendium. **K:** Bekannte Überempfindlichkeit gegen Penicilline, Cephalosporine oder gegen die anderen Inhaltsstoffe von Co-Amoxi-Mepha®. Patienten, die anamnestisch nach Einnahme von Co-Amoxi-Mepha® oder einem anderen Präparat derselben Wirkstoffkombination einen Ikterus oder hepatische Dysfunktionen entwickelten, infektiöse Mononukleose, lymphatische Leukämie. **Vorsichtmassnahmen:** Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, bei Langzeitbehandlung (evtl. Blutbildkontrollen), bei Leberfunktionsstörungen, schweren Magen-Darm-Störungen; Asthma bronchiale, Heuschupfen, Urikaria, usw. Mögliches Auftreten von anaphylaktischen oder anaphylaktoiden Reaktionen. Bei schweren und anhaltenden Durchfällen. Bei Neigung zu Überempfindlichkeitsreaktionen auf Penicilline, Cephalosporine oder andere Allergene, bei gleichzeitiger Behandlung mit Antikoagulantien. Schwangerschaft, Stillzeit. **Schwangerschafts-Kategorie:** B. **Unerwünschte Wirkungen:** Überempfindlichkeitsreaktionen: Hautausschlag, Pruritus, Urikaria, anaphylaktische und anaphylaktoiden Reaktionen. Blutbildveränderungen, Verlängerung der Blutungszeit und Prothrombinzeit. Interstitielle Nephritis, Gastrointestinale Störungen (selten: pseudomembranöse hämorrhagische Kolitis), Anstieg von AST und/oder ALT, Hepatitis, cholestatischer Ikterus. Hyperaktivität, Erregung, Angst, Schlaflosigkeit, Verwirrung, Verhaltensänderung, Benommenheit, Kopfschmerzen, Krämpfe, Zahnverfärbung. **Interaktionen:** Probenecid, Hemmung der renalen Elimination von Amoxicillin, nicht gleichzeitig anzuwenden. Interaktionen mit bakteriostatischen Antibiotika. Erhöhte Resorption von Glykosiden, verminderte Wirkung von oralen Kontrazeptiva. Erhöhte Inzidenz von allergischen Hautreaktionen bei Co-Medikation mit Allopurinol, Verstärkung der Antabus-Wirkung von Disulfiram. **Listeneinteilung:** A. Für weiterführende Informationen siehe Arzneimittel-Kompendium.

Zusätzliche Informationen über Co-Amoxi-Mepha® erhalten Sie über unseren Literatur-Service: medzinschweiz@mepha.ch

Mepha Pharma AG, CH-4147 Aesch/BL, Tel. 061/705 43 43, Fax 061/705 43 85, www.mepha.ch

INHALT SOMMAIRE

EDITORIAL

LOA: Positive Zwischenbilanz
RBP: un bilan intermédiaire positif

AKTUELL ACTUEL

Die SAZ spricht mit Dr. Marcel Mesnil,
Generalsekretär des SAV 251
Entretien avec le D^r Marcel Mesnil,
secrétaire général de la SSPH 257

PHARMAZIE UND MEDIZIN PHARMACIE ET MÉDECINE

Davos 2002 263
Progression du bacille multi-résistant de la tuberculose 266
Swissmedic (Schweiz. Heilmittelinstitut)
zum neuen Heilmittelgesetz 267
Mitteilung des Swissmedic,
Pharmacovigilance-Zentrums 269

BILDUNG UND SERVICE FORMATION ET SERVICE

Die WIZE informiert 270

GESELLSCHAFTEN UND INDUSTRIE SOCIÉTÉS ET INDUSTRIE

Le conseil favorise la compliance... 272
Firmen-News / Informations des entreprises 274

FORUM

Neue Bücher 276

PERSÖNLICH POINT DE VUE

Dr. Josef Landolt zum Gedenken 277