

# Diabetes-Depesche

Schnellinformationen für den niedergelassenen Arzt

**Vermindert Vitamin D bei Kindern das Diabetes-Risiko? → 3**

**Adoleszente Diabetiker streng überwachen! → 6**

**Computer hilft bei Therapie-Management → 8**

**Was tun bei Insulin-Anaphylaxie? → 5**

**Selbstmessung deckt Hypertonie früher auf → 10**

**„Zucker“ muss nicht dumm machen → 12**

**An die Hände denken beim diabetischen Fuß! → 18**

**Wadenschmerzen waren ein Muskelinfarkt → 21**

**Antioxidanzien schützen vor Retinopathie – zumindest Ratten → 22**

■ Mit Literaturdienst

## Diagnose/Prophylaxe

Supplementation: Vitamin D senkt Diabetesrisiko bei Kindern	<i>Lancet</i>	3
Mäßig, aber regelmäßig: Täglich ein Drink senkt Diabetesrisiko	<i>Diabetes</i>	3
Neue diagnostische Kriterien: KHK-Risiko auch bei „mildem“ Diabetes erhöht	<i>J Am Coll Cardiol</i>	3
Patienten über 45: Wann lohnt sich das Diabetes-Screening?	<i>BMJ</i>	4
Frühzeitige Diabetes-Diagnose: Ketoazidotische Hirnschäden können vermieden werden	<i>Pediatric Diabetes</i>	4
Trinkwasser-Zusammensetzung: Schützen Magnesium und Zink vor Diabetes?	<i>Diabet Med</i>	4

## Typ-1-Diabetes

Selten, aber nicht ungewöhnlich: Anaphylaxie nach Insulin-Injektion	<i>J Ark Med Soc</i>	5
Gipfelstürmende Patienten: Mit Typ-1-Diabetes auf den Kilimandscharo	<i>Diabet Med</i>	5
Hypoglykämie-Gefahr und ... ... Gewichtsprobleme unter intensivierter Insulintherapie	<i>Diabetes Care</i>	5
Überproportionale Kosten: Kinder mit Diabetes zu oft im Krankenhaus	<i>Diabetes Care</i>	6
Blutzucker außer Kontrolle: Adoleszente Diabetiker intensiver überwachen	<i>Diabetes Care</i>	6
Hypoglykämie am Steuer: Nur jeder Dritte reagiert richtig	<i>Diabetes Res Clin Pract</i>	6

© SITE-SEEING DIABETES im Internet 22

## Typ-2-Diabetes

Therapie mit vielen Facetten: Das wichtigste Kontrollinstrument ist die Waage	<i>Symp.</i>	8
Der Computer hilft: Mit HOMA lässt sich Insulinpflicht besser vorhersagen	<i>Diabet Med</i>	8
Diabetes im 21. Jahrhundert: Blutzucker im Auge behalten	<i>South Med</i>	8
Glitazone und Angiotensin-II-Antagonisten: Fortschritt für Diabetes- und Hochdrucktherapie	<i>Symp.</i>	10
Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck: Selbstmessung deckt Hypertonie früher auf	<i>Diabet Med</i>	10
Lokale Insulinallergie: Da hilft nur noch die Insulinpumpe	<i>Diab Med</i>	12

7.5. A  
5161  
-16,8 bel. -  
ZB MED

weiter Seite 2 ►