

**SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten/
- junior® 5 mg Kautabletten/ - mini 4 mg Kautabletten**

Wirkstoff: Montelukast-Natrium. **Zusammensetzung:** *Arzneilich wirksame Bestandteile:* 1 SINGULAIR® mini 4 mg Kautablette enthält 4,2 mg Montelukast-Natrium, entsprechend 4,0 mg Montelukast; 1 SINGULAIR junior® 5 mg Kautablette enthält Montelukast-Natrium 5,2 mg, entsprechend 5,0 mg Montelukast; 1 SINGULAIR® 10 mg Filmtablette enthält Montelukast-Natrium 10,4 mg, entsprechend 10 mg Montelukast. *Sonstige Bestandteile:* SINGULAIR® mini 4 mg Kautabletten: D-Mannitol; Mikrokristalline Cellulose; Hyprolöse; Eisen(III)-oxid (Farbstoff E 172); Croscarmellose-Natrium; Kirsch-Aroma, Permaseal, künstlich, 481612 Givaudan-Roure, Aspartam und Magnesium (stearat, palmitat, oleat). SINGULAIR junior® 5 mg Kautabletten: D-Mannitol, Mikrokristalline Cellulose, Hyprolöse, Eisen(III)-oxid (Farbstoff E 172), Croscarmellose-Natrium, Permaseal, synthetisches Kirsch-Aroma 181612, Aspartam, Magnesiumstearat. SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten: Mikrokristalline Cellulose, Lactose Monohydrat (89,3 mg), Croscarmellose-Natrium, Hyprolöse, Magnesium (stearat, palmitat, oleat), Filmüberzug: Hypromellose, Hyprolöse, Titandioxid (Farbstoff E 171), Eisen(III)-oxid (Farbstoff E 172), Eisenoxidhydrat (Farbstoff E 172), Carnaubawachs. **Anwendungsgebiete:** Als Zusatzbehandlung bei Patienten mit leichtem bis mittelgradigem chronischem Asthma, das mit einem inhalativen Kortikoid nicht ausreichend behandelt und das durch die bedarfsweise Anwendung von kurzwirksamen β -Sympathomimetika nicht ausreichend unter Kontrolle gebracht werden kann. Zur Prophylaxe der belastungsinduzierten Bronchokonstriktion (Belastungsasthma). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile dieser Arzneimittel. **Warnhinweis:** Die 4-mg-Kautabletten und die 5-mg-Kautabletten enthalten Aspartam. **Nebenwirkungen:** SINGULAIR® mini 4 mg Kautabletten: Durst wurde häufig als Nebenwirkung bei mit Montelukast behandelten Patienten angegeben. Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Montelukast nicht gesichert werden konnte, wurde folgende unerwünschte Arzneimittelwirkung angegeben, die bei mehr als 3 % der pädiatrischen Patienten von 2-5 Jahren und häufiger als unter Placebo auftrat: Husten. SINGULAIR junior® 5 mg Kautabletten: Die häufigste Nebenwirkung, die in Verbindung mit der Einnahme von SINGULAIR junior® 5 mg Kautabletten stehen könnte, war Kopfschmerz. Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Montelukast nicht gesichert werden konnte, wurden folgende unerwünschte Arzneimittelwirkungen angegeben, die bei mehr als 3 % der pädiatrischen Patienten von 6-14 Jahren und häufiger als unter Placebo auftraten: Pharyngitis, Influenza, Fieber, Sinusitis, Übelkeit, Diarrhoe. SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten: Die häufigsten Nebenwirkungen, die in Verbindung mit der Einnahme von SINGULAIR® 10 mg Filmtabletten stehen könnten, waren abdominale Beschwerden und Kopfschmerzen. Auch wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Montelukast nicht gesichert werden konnte, wurden folgende unerwünschte Arzneimittelwirkungen angegeben, die bei mehr als 1 % der Patienten und gleich häufiger oder häufiger als unter Placebo auftraten: Kopfschmerzen, abdominale Beschwerden, Schwäche/Erschöpfung, Fieber, Trauma, Diarrhoe, Dyspepsie, infektiöse Gastroenteritis, Zahnschmerzen, Schwindel, Insomnie, verstopfte Nase, Husten, Influenza, Exantheme. Unter der Therapie mit Montelukast wurde nach Markteinführung folgendes berichtet: Schwäche/Erschöpfung, Unwohlsein, Ödeme, Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Anaphylaxie, Angioödem, Urtikaria, Juckreiz, Exanthem und - ein Einzelfall mit eosinophilen Leberinfiltraten); Schwindel, verändertes Träumen einschließlich Alpträume, Benommenheit, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Ruhelosigkeit, Krampfanfälle; Arthralgie, Myalgie einschließlich Muskelkrämpfe; Diarrhoe, Mundtrockenheit, Dyspepsie, Übelkeit, Erbrechen; erhöhte Blutungsneigung, Blutergeruss. *Hinweis für Verkehrsteilnehmer:* Es ist nicht zu erwarten, dass SINGULAIR® die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen eines Patienten beeinträchtigt. Allerdings wurde sehr selten von einzelnen Patienten über Benommenheit berichtet. **Dosierung:** Kinder von 2-5 Jahren: 1 Kautablette SINGULAIR® mini 4 mg tgl. vor dem Schlafengehen. Kinder von 6-14 Jahren: 1 Kautablette SINGULAIR junior® 5 mg tgl. vor dem Schlafengehen. Erwachsene: 1 Filmtablette SINGULAIR® 10 mg tgl. vor dem Schlafengehen. Die Anwendung von Montelukast bei Kindern unter 2 Jahren wird nicht empfohlen, bis weitere Daten vorliegen, da die Erfahrungen begrenzt sind. **Verschreibungspflichtig.**

Stand: 11/2001

Weitere Informationen enthalten die Fach- und die Gebrauchsinformationen, deren aufmerksame Durchsicht wir empfehlen.

DIECKMANN ARZNEIMITTEL GMBH
Postfach 1202, 85530 Haar

Mitvertrieb:
MSD SHARP & DOHME GMBH, 85530 Haar
MSD CHIBROPHARM GMBH, 85530 Haar
CHIBRET PHARMAZEUTISCHE GMBH, 85530 Haar
VARIPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, 85530 Haar

Mein YAHOO! Für Ärzte

www.meinearztseite.de/Hotline:0800/6730673

MSD
Infocenter

Tel.: 0800/673 673 673
Fax: 0800/673 673 329
e-mail: infocenter@msd.de



Welche Diagnose wird gestellt?

Consilium Infectiorum: Therapie der chronischen Urethritis
Hansjörg Bachmann346

Magazin

A Propos Impfphonorare
Olaf Ganssen348

Fortbildungstermine des BVKJ349

Tagungen.....353

Bücher354

Berufsfragen

Der Honorararusschuss informiert
Wolfram Hartmann.....356

Novellierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung für Kinder- und Jugendmedizin
Franz-Josef Drobnitzky.....360

Personalia359, 364

Wahlaufufe für die Landesverbände Thüringen und Sachsen-Anhalt359, 363

Die Assekuranz AG informiert: Die Rentenreform 2001 (das Altersvermögensgesetz)365

Zum Tode von Herrn Professor Dr. med. Kurt Hartung
Theodor Hellbrügge367

Herrn Sanitätsrat Dr. med. Hans Blatt zum 75. Geburtstag
Klaus Gritz368

Ausgezeichnet und geehrt...369

Wichtige Telefon- und Telefax-Nummern/
Impressum.....376

Pharma-Info371

Praxistafel.....345

Beilagenhinweis:

Dieser Ausgabe liegt das Programmheft der 32. Jahrestagung des BVKJ (Kinder- und Jugendärztetage) vom 14.-16. Juni 2002 in Würzburg mit den Anmeldeformularen bei.

Wir bitten um freundliche Beachtung!

Zum Titelbild:

Wieder lebhaft Diskussion auf dem Forum für Gesundheits- und Sozialpolitik in Berlin, das der BVKJ nun schon zum 5. Mal veranstaltete. Lesen Sie hierzu den Bericht auf Seite 289 ff. (Fotos: Heide Reiss, Berlin)