



In einem mittelgroßen Krankenhaus mit ca. 10.000 Narkosen pro Jahr wird (statistisch gesehen) jedes Jahr 1 Patient bleibend geschädigt.  
(s. auch Beitrag von C. Grube et al. in diesem Heft)  
(Gestaltung: de'blik, Berlin)



## Notfallmedizin

**Leitlinien des European Resuscitation Council 2000 für lebensrettende Sofortmaßnahmen beim Erwachsenen. Stellungnahme der Basic Life Support and Automated External Defibrillation Working Group nach Verabschiedung durch das Executive Committee des European Resuscitation Council** 293  
Guidelines of the European Resuscitation Council 2000 for basic adult life support. A statement of the Basic Life Support and Automated External Defibrillation Working Group as approved by the Executive Committee of the European Resuscitation Council

**Leitlinien des European Resuscitation Council 2000 für erweiterte lebensrettende Maßnahmen beim Erwachsenen. Stellungnahme der Advanced Life Support Working Group nach Verabschiedung durch das Executive Committee des European Resuscitation Council** 299  
Guidelines of the European Resuscitation Council 2000 on advanced adult life support. A statement of the Advanced Life Support Working Group as approved by the Executive Committee of the European Resuscitation Council

## Schmerztherapie

M. K. Herbert · P. Holzer  
**Warum versagen Substanz P (NK1)-Rezeptorantagonisten in der Schmerztherapie?** 308  
Why are substance P (NK1)-receptor antagonists ineffective in pain therapy?

## Leserbriefe

L.J. Hoeve  
**Größte Vorsicht bei Tuben mit Cuffs. Bemerkungen zur Arbeit „Die Wahl des endotrachealen Tubus beim Säugling und Kleinkind: Mit oder ohne Cuff?“ von T. Erb und F.J. Frei [Anaesthesist (2001) 50:395–400]** 320

J. Holzki  
**Tuben mit Cuff im Neugeborenen- und Kleinkindesalter ein Risiko! Weitere Bemerkungen zur Arbeit von T. Erb und F.J. Frei [Anaesthesist (2001) 50:395–400]** 321

H.J. Schultz-Coulon  
**Diskussion um geblockte oder ungeblockte Tuben überflüssig. Weitere Bemerkungen zur Arbeit von T. Erb und F.J. Frei [Anaesthesist (2001) 50:395–400]** 324

T. Erb · F.J. Frei  
**Der Faktor Cuff allein kein Risiko. Erwiderung auf die vorstehenden Bemerkungen von L.J. Hoeve, J. Holzki und H.J. Schultz-Coulon** 325

M. Jöhr  
**Die Wahl der Tubusgröße beim Kind** 326

## Weiter- und Fortbildung Continuing education

M. Steinfath · F. Wappler · J. Scholz  
**Maligne Hyperthermie. Allgemeine, klinische und experimentelle Aspekte** 328  
Malignant hyperthermia

## Verschiedenes Miscellaneous

**Fachnachrichten · News** 271  
**Termine · Forthcoming meetings** A 23  
**Vorschau · Preview** A 26