

Nr. 5/2002, 9. Jahrgang

K. Huber Brief des Herausgebers	III
O. M. Hess, Th. Suter, P. Mohacsi Editorial: Medikamentöse Therapie der Herzinsuffizienz	167
J. Bergler-Klein, R. Pacher Endothelin-Antagonisten in der neurohumoralen Therapie der chronischen Herzinsuffizienz	169
F. M. Fruhwald, G. Ledl, R. Flener für die teilnehmenden Ärzte Betablockertherapie mit Bisoprolol bei Herzinsuffizienz in der Praxis – die CORAM-Anwendungsbeobachtung	176
B. M. Richartz, St. Betge, H. R. Figulla Prävalenz und Prognose der diastolischen Herzinsuffizienz	182
Rubriken	
Echo	187
EKG	189
Fallbericht (Moderator: K. Huber): M. Gattermeier, H. Kratzer, E. Zeindlhofer, P. Kühn: Subakute Stentthrombose trotz optimaler antithrombotischer Medikation Kommentare von G. Gaul und Ch. Punzengruber	191
Medizintechnik – Produkte – Informationen	196
Wir stellen vor: Herz-Kreislauf-Sonderkrankenanstalt Bad Ischl der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft	200
Kongreßberichte vom American College of Cardiology, 51 <sup>st</sup> Annual Scientific Session Atlanta, 17.–20. März 2002	203, 220
Buchbesprechungen	206
Für Sie gelesen	207
Pharma-News	211
Impressum	222

Titelbild: Abklärungsalgorithmus bei Herzinsuffizienz. Aus: O. M. Hess et al., S. 167

## Fachinformation zum Inserat auf Seite IV

**BLOPRESS® 16 / 8 mg Plus** : Zusammensetzung: 1 Tablette enthält 8 mg bzw. 16 mg Candesartancilexetil und 12,5 mg Hydrochlorothiazid. Hilfsstoffe: Carmellose-Calcium, Hydroxypropylcellulose, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Maisstärke, Macrogol 8000, bzw. Eisenoxid rot E172 (bei Blopress 16 mg Plus). Anwendungsgebiete: essentielle Hypertonie, wenn eine Monotherapie mit Candesartancilexetil oder Hydrochlorothiazid nicht ausreichend ist. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber einem Bestandteil des Präparates oder gegenüber Sulfonamidderivaten, Schwangerschaft und Stillzeit, schwere Nierenschädigung, schwere Leberschädigung und/oder Cholestase, Refraktäre Hypokaliämie und Hyperkalzämie, Gicht. Pharmakologisch-therapeutische Gruppe: Angiotensin-II-Antagonisten und Thiaziddiuretika. Abgabe: Rp, apothekenpflichtig. Packungsgröße: 28 Stück. Zulassungsinhaber: Takeda Pharma Ges.m.b.H., A-1070 Wien, Seidengasse 33-35, Tel. 01/524 40 64, Fax: 01/524 40 66. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. "Albert Einstein" Licensed by the Hebrew University of Jerusalem, Represented by the Roger Richman Agency, Inc., www.albert-einstein.net

