


Co-Amo Mepha 1

Amoxicillin / Clavulansäure



Gute Karten in Sachen Antibiotika-Therapie

NEU

Mit der Einführung der **1 Gramm-Form** bieten wir Ihren Patienten noch mehr Vorteile:

- Einnahme nur noch 2 x täglich!
- 30% günstiger als das Original!

kassenzulässig

mepha

Okay mit Mepha-Generika

Kurzcharakteristik Co-Amoxi-Mepha*

Co-Amoxi-Mepha* 375 / 625 / 1000; Lactab*. Co-Amoxi-Mepha* 156.25 / 312.5; Pulver zur Zubereitung von 100 ml Suspension. Antibiotikum (Aminopenicillin kombiniert mit Clavulansäure) Z; 1 Lactab* zu 375 mg enthält: Amoxicillinum anhydricum 250 mg, Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 125 mg, 1 Lactab* zu 625 mg enthält: Amoxicillinum anhydricum 500 mg, Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 125 mg, 1 Lactab* zu 1000 mg enthält: Amoxicillinum anhydricum 875 mg, Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 125 mg, 5 ml Suspension 156.25 mg enthalten: Amoxicillinum anhydricum 125 mg, Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 31.25 mg; Hilfsstoffe: Aromatica, Saccharinum natrium, Natrii benzoas (E 211), 5 ml Suspension 312.5 mg enthalten: Amoxicillinum anhydricum 250 mg, Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 62.5 mg; Hilfsstoffe: Aromatica, Saccharinum natrium, Natrii benzoas (E 211). I: Infektionen mit grampositiven und gramnegativen Erregern (inkl. Keime, die aufgrund von β -Lactamase-Bildung gegen Amoxicillin resistent sind). Tonsillitis, Pharyngitis, Laryngitis, Otitis media, Sinusitis, Akute Bronchitis mit bakterieller Superinfektion und Exazerbation der chronischen Bronchitis, bakterielle Pneumonie, Pyelonephritis, Zystitis, Urethritis, Typhus abdominalis, Paratyphus, Shigellose, Gonorrhoe, Haut- und Weichteilinfektionen, Salpingitis, Adnexitis, Endometritis, bakterielle Vaginitis. Wirkungsspektrum von Amoxicillin/Clavulansäure: vgl. Arzneimittel-Kompendium. D: Abhängig von Alter, Körpergewicht und Nierenfunktion des Patienten sowie vom Schweregrad der Infektion. **Übliche Dosierung:** Erwachsene: leichte und mittelschwere Infektionen: 3 x täglich 375 mg, in speziellen Fällen 2 x täglich 625 mg oder 3 x täglich 375 mg. Schwere Infektionen: 3 x täglich 625 mg, in speziellen Fällen 2 x täglich 1000 mg oder 3 x täglich 625 mg. Kinder: Unter 2 Jahren: 25–50 mg/kg KG täglich, in 3 Dosen. Über 2 Jahre: 25–37.5 mg/kg KG täglich, in 3 Dosen (leichte bis mittelschwere Infektionen), 50–75 mg/kg KG täglich, in 3 Dosen (schwere Infektionen). **Spezielle Dosierungsanweisungen** bei Niereninsuffizienz, Hämodialyse, Patienten unter 40 kg KG, älteren Patienten: vgl. Arzneimittel-Kompendium. **KI:** Bekannte Überempfindlichkeit gegen Penicilline, Cephalosporine oder gegen die anderen Inhaltsstoffe von Co-Amoxi-Mepha*. Patienten, die anamnestisch nach Einnahme von Co-Amoxi-Mepha* oder einem anderen Präparat derselben Wirkstoffkombination einen Ikterus oder hepatische Dysfunktionen entwickelten. Infektiöse Mononukleose, lymphatische Leukämie. **Vorsichtmassnahmen:** Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, bei Langzeitbehandlung (evtl. Blutbildkontrollen), bei Leberfunktionsstörungen, schweren Magen-Darm-Störungen; Asthma bronchiale, Heuschnupfen, Urtikaria, usw. Mögliches Auftreten von anaphylaktischen oder anaphylaktoiden Reaktionen. Bei schweren und anhaltenden Durchfällen. Bei Neigung zu Überempfindlichkeitsreaktionen auf Penicilline, Cephalosporine oder andere Allergene, bei gleichzeitiger Behandlung mit Antikoagulantien. Schwangerschaft, Stillzeit. **Schwangerschafts-Kategorie:** B. **Unerwünschte Wirkungen:** Überempfindlichkeitsreaktionen: Hautausschlag, Pruritus, Urtikaria, anaphylaktische und anaphylaktoiden Reaktionen. Blutbildveränderungen, Verlängerung der Blutungszeit und Prothrombinzeit, Interstitielle Nephritis. Gastrointestinale Störungen (selten: pseudomembranöse haemorrhagische Kolitis), Anstieg von AST und/oder ALT, Hepatitis, cholestatischer Ikterus. Hyperaktivität, Erregung, Angst, Schlaflosigkeit, Verwirrung, Verhaltensänderung, Benommenheit, Kopfschmerzen, Krämpfe, Zahnverfärbung. **Interaktionen:** Probenecid: Hemmung der renalen Elimination von Amoxicillin, nicht gleichzeitig anwenden. Interaktionen mit bakteriostatischen Antibiotika. Erhöhte Resorption von Glykosiden, verminderte Wirkung von oralen Kontrazeptiva. Erhöhte Inzidenz von allergischen Hautreaktionen bei Co-Medikation mit Allopurinol. Verstärkung der Antabus-Wirkung von Disulfiram. **Listeneinteilung:** A. Für weiterführende Informationen siehe Arzneimittel-Kompendium.

Zusätzliche Informationen über Co-Amoxi-Mepha* erhalten Sie über unseren Literatur-Service: medizinschweiz@mepha.ch

Mepha Pharma AG, CH-4147 Aesch/BL, Tel. 061/705 43 43, Fax 061/705 43 85, www.mepha.ch

INHALT SOMMAIRE

EDITORIAL

Echter Bildungsschub
Une véritable poussée de la formation

PHARMAZIE UND MEDIZIN PHARMACIE ET MÉDECINE

Communiqué de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques au sujet de la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques	287
Communication du Centre de Pharmacovigilance de Swissmedic	289
16. Schweizerische Tagung für Phytotherapie	291
AKA-Forum	295

WEITER- UND FORTBILDUNG FPH FORMATION POSTGRADUÉE ET CONTINUE FPH

Weiter- und Fortbildung FPH	299
-----------------------------------	-----

KOMMUNIKATION UND MARKETING COMMUNICATION ET MARKETING

31. Mai: Tag des Nichtrauchens	302
31 mai: La Journée sans tabac	304

GESELLSCHAFTEN UND INDUSTRIE SOCIÉTÉS ET INDUSTRIE

Fondation GENTIANA	305
Stiftung GENTIANA	307
Beratung schafft Compliance	308
Firmen-News / Informations des entreprises	310

FORUM

Neue Bücher	311
-------------------	-----