

935 Zu diesem Heft

Aktuelles – kurz berichtet

- 941 Besteht in Deutschland ein Fortbildungsdefizit?
- 941 Plötzlicher Herztod lässt sich durch frühe Intervention verhindern
- 942 *Postpartale Depressionen*: Intensive Betreuung zur Prophylaxe
- 942 *Helicobacter pylori*: Häufigkeit der Infektion bei Kindern
- 943 *Osteoporosetherapie mit Raloxifen*
Erwünschte Nebeneffekte bei erhöhtem kardiovaskulären Risiko
- 944 90% aller 55–65-Jährigen entwickeln eine Hypertonie
- 944 *Präventive Antimykotikatherapie*: Modernes Triazol soll Amphotericin B ablösen

Kongressberichte

108. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin

- 945 Demenz: Patientenbeobachtung kommt vor der Technik
- 945 Diagnostik und Therapie solider Tumore
- 946 Thrombose: Bei jungen Patienten gezielt nach einer Thrombophilie fahnden

Referiert – kommentiert

- 947 *MADIT-II*: Neue Indikation für Defibrillatoren?
Kommentar: Patientenselektion für Primärprävention muss weiter optimiert werden

948 Personalia

Editorial

- 951 Primäre Prävention des Typ-2-Diabetes
M. Hanefeld

Editorial

- 951 Primary prevention of type 2 diabetes

Originalien

- 953 Prädiktoren von Glukosetoleranzstörungen in einer Risikopopulation für Typ-2-Diabetes: die RIAD-Studie
E. Henkel, C. Köhler, T. Temelkova-Kurktschiev, M. Hanefeld
- 958 Einfluss einer verbesserten Blutzuckereinstellung auf den Lipidspiegel bei Patienten mit Typ-2-Diabetes
K.G. Parhofer, E. Laubach, H.C. Geiß, C. Otto

Original articles

- 953 Predictors of abnormal glucose tolerance in persons at risk of type 2 diabetes: the RIAD study
- 958 Effect of glucose control on lipid levels in patients with type 2 diabetes

962 Mediquiz

Berichte vom 108. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (April 2002) finden Sie unter
www.thieme.de/dmw/dgim2002
