

Inhalt

Brief des Herausgebers	III
K. Huber	
Editorial: Statintherapie 2002	283
K. Kostner	
HMG-CoA Reductase Inhibition in the Treatment of Atherosclerosis: Effects Beyond Lipid Lowering	284
W. März, B. R. Winkelmann	
Effect of Statins on Biliary Lipids and Cholesterol Gallstones	295
J. L. Smith, M. Riottot, L. K. Nathanson	
Antiinflammatorische Therapie mit Statinen? C-reaktives Protein und Atherosklerose	299
J. Auer, R. Berent, E. Laßnig, E. Maurer, T. Weber, B. Eber	
Familiäre Hypercholesterinämie	304
K. Derfler	
LDL-Cholesterin: Wie stark soll es gesenkt werden?	307
B. Paulweber	
Lipide und Diabetes	317
M. Riedl, M. Clodi	
Lipoprotein(a): Metabolismus und Beeinflussung des Plasmaspiegels	321
G. M. Kostner	
Statine in der Prävention des ischämischen zerebralen Insults	325
G. Bodlaj	
Beyond LDL-Cholesterol: New Treatments Raising HDL-Cholesterol or Enhancing Reverse Cholesterol Transports	328
K. Kostner	
RUBRIKEN	
Herzmedikamente	
AT1-Rezeptorblocker nach Val-HeFT	332
Die Wirkung von Nicorandil auf koronare Ereignisse bei Patienten mit stabiler Angina pectoris: Die randomisierte Impact Of Nicorandil in Angina (IONA)-Studie	335
Echo	343
Buchbesprechungen	344
EKG	345
Kongreßberichte	
Die SCOPE-Studie	346
Akutes Koronarsyndrom – Kongreß-Highlights	347
Fortschritte und Neuerungen in der Hyperlipidämitherapie	349
Neue Erkenntnisse ändern die Therapierichtlinien der Hypertonie	351
Für Sie gelesen	354
Medizintechnik – Produkte – Informationen	355
Pharma-News	361
Impressum	357

Titelbild: Reverse cholesterol transport. Aus: K. Kostner, S. 329

Fachinformation zum Inserat auf Seite IV

BLOPRESS® 16 / 8 mg Plus : Zusammensetzung: 1 Tablette enthält 8 mg bzw. 16 mg Candesartancilexetil und 12,5 mg Hydrochlorothiazid. Hilfsstoffe: Carmellose-Calcium, Hydroxypropylcellulose, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Maisstärke, Macrogol 8000, bzw. Eisenoxid rot E172 (bei Blopess 16 mg Plus). Anwendungsgebiete: essentielle Hypertonie, wenn eine Monotherapie mit Candesartancilexetil oder Hydrochlorothiazid nicht ausreichend ist. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber einem Bestandteil des Präparates oder gegenüber Sulfonamidderivaten, Schwangerschaft und Stillzeit, schwere Nierenschädigung, schwere Leberschädigung und/oder Cholestase, Refraktäre Hypokaliämie und Hyperkalzämie, Gicht. Pharmakologisch-therapeutische Gruppe: Angiotensin-II-Antagonisten und Thiaziddiuretika. Abgabe: Rp, apothekenpflichtig. Packungsgröße: 28 Stück. Zulassungsinhaber: Takeda Pharma Ges.m.b.H., A-1070 Wien, Seidengasse 33-35, Tel. 01/524 40 64, Fax: 01/524 40 66. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

" Albert Einstein" Licensed by the Hebrew University of Jerusalem, Represented by the Roger Richman Agency, Inc.,
www.albert-einstein.net "

