

Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde

- 454 Augenveränderungen bei thrombotisch-thrombozytopenischer Purpura (Moschcowitz-Syndrom)
Bilal Beetari, Josef M. Schmidbauer, Tanja Krevet, Andreas Fischer, Klaus W. Ruprecht
- 454 Thrombotic thrombocytopenic purpura (Moschcowitz's disease)
Bilal Beetari, Josef M. Schmidbauer, Tanja Krevet, Andreas Fischer, Klaus W. Ruprecht

Bei Verschlüssen im Choriokapillarisbereich mit Defekten des darüber liegenden Pigmentepithels, wie bei unserer Patientin, ist auch an das Vorliegen eines Moschcowitz-Syndroms zu denken. So müssen die Patienten neben der internistischen und neurologischen Betreuung auch ophthalmologisch untersucht werden.

- 458 Idiopathischer eosinophiler Pseudotumor der Tränendrüse im Kindesalter
Nicolas Feltgen, Claudia Auw-Hädrich, Jürgen Gerling
- 458 Idiopathic eosinophilic orbital pseudotumor of the lacrimal gland in a child
Nicolas Feltgen, Claudia Auw-Hädrich, Jürgen Gerling

Der idiopathische Pseudotumor der Tränendrüse ist bei Kindern sehr selten. Über den Verlauf ohne Therapie ist wenig bekannt. Wir berichten über einen Fall mit spontaner Besserung nach mehreren Jahren.

- 462 Lidaussparende Exenteratio orbitae bei therapieresistenter, schmerzhafter, skleritisassoziierter Entzündung der orbitalen Weichteilgewebe
Arne Viestenz, Fernando Colombo, Leonard M. Holbach
- 462 Orbital exenteration in therapy-resistant painful scleritis-associated inflammation of orbital soft tissues
Arne Viestenz, Fernando Colombo, Leonard M. Holbach

Ein einseitiger entzündlicher Exophthalmus mit Augenbeteiligung kann Erstmanifestation eines Morbus Wegener sein. Therapeutische Option ist zunächst systemische Immunsuppression. Bei Erblindung und starken Schmerzen kann eine Exenteratio orbitae erforderlich sein.