



Persistierende knotige Lokalresektion nach s.c.-Injektion von Interleukin-2. *Oben:* Gerötete Knoten an den Injektionsstellen von IL-2. *Unten:* Dichte lymphozytäre Infiltrate mit atypischen Lymphozyten innerhalb der Fettläppchen. Siehe auch Beitrag von K. Assmann et al. auf den Seiten 554ff. (Gestaltung: deblik Berlin)

Wie lautet Ihre Diagnose?

A. Gauger · M. Braun-Falco · S. Stachowitz · J. Ring · D. Abeck
Akut aufgetretene ödematöse Ekchymosen beim Kleinkind 559
 Acute edematous ecchymoses in young children

Weiter- und Fortbildung *Continuing education*

C. Hafner · S. Meyer · T. Vogt
Mechanismen der epithelialen Regeneration 561
 Mechanisms of epithelial regeneration

Fragebogen 577
 Questionnaire

DDG aktuell *DDG today*

Mitteilungen der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft 439
 Communications of the German Dermatology Society

Fachnachrichten · News 533, 535, 549, 553, 558

Berichte und Briefe · Reports and letters 579

Termine · Forthcoming meetings A 17

Vorschau · Preview A 20

