

→ Onkologie	40
P. Jungmayr Praxis der Chemotherapie – Nebenwirkungen und Supportivmaßnahmen	
→ Gesundheitspolitik	46
E. Christmann Disease-Management-Programme – Teil 2: Die am Disease Management beteiligten Gruppierungen	
→ Fortbildung	49
Videopharm Jahrgang 2002	
→ ComPharm	54
Neues Internetangebot: apotheken.de kooperiert mit mobile life	
Alzheimer-Patienten: Von künstlicher Intelligenz betreut	
Brustkrebsbehandlung: Der Computer als Entscheidungshilfe	
→ Briefe	
→ Pharma und Partner	71
→ Pharmazeutisches Recht	
Zulassung von Arzneimitteln	81
Zulassung von Sera und Impfstoffen	81
Zulassung von Tierarzneimitteln	81
Baden-Württemberg: Änderung der Hautpsatzung	81
Baden-Württemberg: Änderung der Beitragsordnung	81
Baden-Württemberg: Änderung der Berufsordnung	82
→ Was · Wann · Wo	85
Termine und Ankündigungen	
Tagungen 2002	
→ Personen	
→ Apotheken	
→ Rückruf	107
→ Impressum	108

BAH: Solidarsystem durch Selbstmedikation entlasten

Die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) steigen auch 2002 weiter – wenn gleich auf etwas schwächerem Niveau als im vergangenen Jahr. Die Zielvereinbarungen der Ärzte und Krankenkassen, die Ausgaben um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr zu senken, rücken in immer weitere Ferne. Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) setzt sich angesichts der finanziellen Engpässe bei den Kassen für eine Stärkung der Eigenverantwortung der Versicherten und eine Ausgabensteuerung durch finanzielle Anreize ein. Auch die Rahmenbedingungen des OTC-Marktes müssten gestärkt werden. → 20

Nateglinid + Metformin verbessern die Blutzuckereinstellung

Neue Daten zeigen, dass Nateglinid in Kombination mit Metformin die Blutzuckereinstellung von Typ-2-Diabetikern deutlich verbessert. Patienten, die mit Metformin allein nicht optimal eingestellt werden können, profitieren von einer signifikant besseren Kontrolle der Blutglucose unter der zusätzlichen Gabe von Metformin. → 38

Infliximab-Erhaltungstherapie bei Morbus Crohn

Patienten mit aktivem Morbus Crohn, die auf eine erste Infliximab-Infusion ansprechen, profitieren von einer weiteren Erhaltungstherapie im Acht-Wochen-Rhythmus. Das ergab die so genannte ACCENT-I-Studie über einen Zeitraum von einem Jahr. → 32

Antimykotika: Voriconazol und liposomales Amphotericin B im Vergleich

Ist das Azol-Antimykotikum Voriconazol eine gleich wirksame, weniger toxische Alternative zu liposomalem Amphotericin B in der empirischen Behandlung von Patienten mit Neutropenie und anhaltendem Fieber? Dieser Frage wurde in einer randomisierten Studie nachgegangen. → 34

Mystery-Shopper-Studie

Einer jetzt veröffentlichten Studie des Bundesverbands Mystery Shopper zufolge fühlen sich 37% der Testkunden in Apotheken schlecht bzw. gar nicht beraten. Nur 33% der von anonymen Testkäufern besuchten Apotheken nahmen ihre Beratungspflicht ernst, so das weitere Ergebnis der Studie. In einer Randnotiz setzen wir uns kritisch mit dieser Studie auseinander und fragen, wer wohl der Auftraggeber sein könnte. → 24